

裂，边缘薄，常成皱波状，具缘毛，在内的2片较小，狭卵形，先端钝；花冠淡蓝紫色，花冠管长约7毫米，上唇退化，下唇宽大，伸展，宽倒卵形，先端3浅裂，内面两侧各有1条宽约4毫米的被毛带；雄蕊4，近等长，花丝粗厚，近软骨质，在每一花丝基部着生处有白色毛，花药1室，长圆形，被髯毛；子房顶部顶软骨质，2室，每室有胚珠2。蒴果长圆形，长3厘米，径约1.5厘米，具珠柄钩，有种子4颗。种子肾形，两侧扁，长1.1厘米，灰白色，种皮有细密皱褶。花期5—6，果期6—7月。

产福建和广东。散生于海滨红树林沼泽中。模式标本采自福建龙海。

6. 百筋花属* *Blepharis* Juss.

Juss. Gen. Pl. 103.1789; Nees in DC. Prodr. 11: 265.1847; T. Anders. in Journ. Linn. Soc. Bot. 7: 34.1861 et 9: 499.1867; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 1089; 1873; Lindau in Engl. u. Prantl. Pflanzenfam. 4.3b: 316.1895.

草本或亚灌木；叶对生或4片轮生，全缘或有齿，有时有刺；花两性，单生叶腋或数朵排成顶生稠密的穗状花序；苞片、小苞片顶端具刺毛；萼裂片4，外方1对较大，内方1对较小；花冠单唇形，上唇退化，下唇阔大，伸展，顶端3浅裂，花冠管卵球形，软骨质 (cartilaginous)；雄蕊4，2长2短或有时近等长，着生喉部，花丝粗厚，前方1对雄蕊的花丝顶端向上延伸成塔状附属体，花药1室，背着，药室长圆形，纵裂，裂口边缘密被髯毛；花盘环状，子房无毛，2室，每室有胚珠2粒，花柱线形，柱头2浅裂，蒴果长圆形或椭圆形，有光泽。种子着生于粗壮的珠柄钩上，近圆形，两侧稍压扁，表面粗糙。

本属约80—100种，产地中海东部、热带非洲至南非、马达加斯加、阿拉伯、印度。我国1种。

1. 百筋花 (植物研究) 图版 4: 12—14

Blepharis maderaspatensis (L.) Roth. Nov. Pl. Sp. 320.1821; Santapau in Univ. Bombay Bot. Mem. 2: 15.1951. — *Acanthus maderaspatensis* L., Sp. Pl. 892.1753. — *Blepharis boerhaaviaefolia* Pers., Syn. Pl. 2: 180.1806; Nees in Wall. Pl. As. Rar. 3: 97.1832; et DC. Prodr. 11: 266.1847; T. Anders. in Jour. Linn Soc. Bot. 9: 500.1867; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 478.1885; R. Ben. in H. Lec, Fl.-Gen. Indo-Chine 4: 695.f. 76. (1—3) 1935.

平卧草本，茎被短柔毛；叶4片轮生，近膜质，椭圆形、长圆形或倒卵状披针形，

* 本属与老鼠簕属最为接近，其主要区别在于本属前对雄蕊花丝顶端向上延伸一塔状附属体。