

宽1—2.5厘米，先端急尖，钝，基部圆，上面及背面脉上被稀疏糙伏毛，有缘毛，无柄；花序苞片线形，长11毫米，宽1.5毫米，先端有缘毛，花苞片叶状，椭圆形或卵形，长9毫米，宽4.5毫米，有短柄，下延至柄两侧成为翅，特征如同花序苞片，小苞片线形，长7毫米，宽1毫米；花萼5裂，裂片三角状披针形，长7毫米，宽1毫米，先端被缘毛；花冠白色、淡蓝色或粉红色，花冠管长4毫米，喉部扩大，长5毫米，冠檐5裂，裂片近相等，圆形，直径4毫米，顶端微缺，2长雄蕊花丝长3.5毫米，着生在喉中部，2短雄蕊花丝长1.5毫米，着生喉基部，花丝无毛；花粉粒圆球形，具3孔（G. Forrest 2774. 云南丽江；钟观光 2421. 云南漾濞）；子房长椭圆形，无毛，花柱纤细，长约14毫米，连同柱头被白色柔毛，柱头2裂，裂片不等长。蒴果圆柱状，长达2厘米，径2毫米，2片裂，每片有2列种子8颗。种子近圆形，两侧压扁，长1.7毫米，宽1.5毫米，黑色，被长柔毛，遇水毛伸展。

产四川南部、云南中北部及贵州。生于海拔750—3000米的山地草坡、疏林下。我国特有。模式标本采自云南宾川大坪子。

9. 拟地皮消属* *Leptosiphonium* F. v. Muell.

F. v. Muell. Descript. Notes Papuasias Pl. 7: 32. 1886. — *Ruellia* L.
sect. *Leptosiphonium* (F. v. Muell.) Lindau in Engl. u Prantl, Nat.
Pflanzenfam. 4. 3b: 309. 1895.


草本。单株或稀分枝，茎合轴，直立。叶具柄，叶片顶端渐尖。花对生于枝顶两侧叶腋，呈总状花序或穗状花序状。苞片和小苞片狭，较萼短。花萼5深裂，几至基部，裂片长而狭，急尖，宿存。花冠通常淡黄色，黄色或橙黄色，稀白色或淡堇色，高脚碟形；冠管狭而极长，至喉部漏斗形，短而内弯扩大；冠檐裂片近相等，椭圆形或倒卵形，顶端圆。雄蕊基部着生于花冠中部下沿的褶处；外方的稍长，花药近直立，线状矩圆形，基部箭形。顶端钝，药室伸展。花粉粒圆球形，蜂窝状纹饰，退化雄蕊无。子房圆柱形，每室通常有10—20粒胚珠，柱头后裂片比前裂片短一半；背腹两面扁平。蒴果圆柱形，自基部生种子。

本属约10种，主要分布巴布亚新几内亚及邻近岛屿。我国产的这个种是亚洲大陆惟一的一个种，星散分布于江西、福建、广东北部和东北部、广西。根据这些情况判断，本种似是一个孑遗种。

属名模式：*Leptosiphonium stricklandii* F. v. Muell.

1. 拟地皮消（中国高等植物图鉴） 飞来蓝（植物研究） 图版6: 1—5

* 拟地皮消属（中国种子植物科属词典）*Leptosiphonium* F. v. Muell., 又名飞来蓝属（植物研究）。



图版 6 1—5. 拟地皮消 *Leptosiphonium venustum* (Hance) E. Hossain: 1. 植株一部分, 2. 花冠及雄蕊, 3. 花萼, 4. 花药及花丝, 5. 柱头。6—12. 喜花草 *Eranthemum pulchellum* Andrews.: 6. 植株一部分, 7. 花冠及雄蕊, 8. 花萼, 9. 花萼裂片, 10. 雄蕊, 11. 花粉粒, 12. 苞片。(余汉平、李爱莉绘)

Leptosiphonium venustum (Hance) E. Hossain in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **32** (3): 408.1973; 中国高等植物图鉴 **4**: 155.t. 5723.1975; H. S. Lo in Bull. Bot. Res. **1** (4): 102.1981.——*Ruellia venusta* Hance in Journ. Bot. **6**: 92.1868; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 238.1891; Dunn et Tutch. in Kew Bull. add. ser. **10**: 197.1912.——*Ruellia seclusa* S. Moore in Journ. Bot. **14**: 208.1876; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 238.1891; 植物研究 **1** (4): 102.1981.、

草本，茎直立，不分枝或少分枝，高达 60 厘米。叶矩圆状披针形，披针形或倒披针形，长 5—12 厘米，宽 1.5—3 厘米，顶端尖，基部楔形，下沿，具短柄，边略呈浅波状。花单生上部叶腋或数朵集生枝端；苞片披针形，长 5—7 毫米；花萼长 7—8 毫米，5 深裂至中部或中部以下，裂片狭披针形；花冠淡紫色，漏斗状，全长 4—5.5 厘米，冠管细长，长 2.2—3.5 厘米；冠檐 5 裂，裂片几相等，长 7—17 毫米，顶端浅波状；雄蕊 4，2 强，药室纵裂，药隔斧形；子房无毛，花柱疏生短柔毛，柱头 2 裂。

产广东（清远）、福建（南平、长汀、建阳）、江西（九江、安福、修水、萍乡、瑞金、龙南）。生林下或山坡草地。模式产广东清远飞来寺。

10. 喜花草属* *Eranthemum* L.

L. Sp. Pl. 9.1753; id. Gen. Pl. ed. 5.9.1754; Nees in Wall. Pl. As. Rar. **3**: 76 et 106.p. p.; id. in DC. Prdor. **11**: 445.1847.——*Daedalacanthus* T. Anders. in Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. 229.1860; C. B. Clarke in Fl. Brit. Ind. **4**: 418.1885.

小灌木或多年生直立草本。叶具叶柄；叶片椭圆形、卵形至披针形，全缘、浅波状或具圆齿。穗状花序通常顶生；苞片大，长于花萼，具羽状脉，小苞片通常短于花萼；花萼 5 裂，通常狭三角形；花冠高脚碟状，花冠管细长；喉部短，冠檐 5 裂，裂片近相等，近圆形或倒卵形，伸展；雄蕊 4，外方 2 雄蕊发育，着生于喉下部，花丝褶（plica）几延至花冠管基部，不外露或外露，内方的不育雄蕊棍棒状或线状，花药长圆形；花粉粒圆球形，3 孔，具蜂窝状纹饰，纹孔中具小突起；子房每室有 2 胚珠，花柱无毛或有毛，柱头后裂片极短于前裂片，背腹扁。蒴果棒状，每室具 2 种子，具珠柄钩。种子两侧扁，被贴伏长毛，遇水伸展。

约 30 种，分布于亚洲热带至亚热带地区、印度、斯里兰卡，东至小巽他群岛。我国 4 种，分布于南部及西南部；常见栽培 1 种。

属名模式：*Eranthemum capense* L.

* 喜花草属 *Eranthemum* L. 又名可爱花属（广州植物志）。