

1b. 贵港水蓼衣 (广西植物)

var. *longihirsuta* H. S. Lo et D. Fang in *Guihaia* **17** (1): 41.1997.

本变种茎粗壮，蒴果长 1.5—1.7 厘米。而与大花水蓼衣近似，但与原变种和大花水蓼衣的区别在于：宿存的小苞片和花萼裂片外面被锈色长硬毛。

产广西贵县。生于溪边。

2. 小叶水蓼衣

Hygrophila erecta (Burm. f.) Hochr. in *Candollea* **5**: 230, 1934; 海南植物志 **3**: 546.1974; H. S. Lo et D. Fang in *Guihaia* **17**(1):41.1997. — *Ruellia erecta* Burm. f. *Fl. Ind.* 135 t. 41.f. 3.1768. — *Hygrophila phlomoides* Nees var. *roxburghii* C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* **4**: 408.1884; Merr. et Chun in *Sunnyatsenia* **2**: 324.1935.

多年匍匐草本，有时基部稍木质；茎和分枝均被白色广展硬毛，上部很密。叶纸质，无柄或有短柄，叶片通常倒卵形，有时椭圆形或长椭圆形，长 1—5 厘米，顶端钝或圆，基部楔形，两面被白色紧贴硬毛，钟乳体明显；侧脉纤细。花无梗，数至多朵于小枝上部腋生；苞片长圆状披针形，长约 8 毫米，密被白色硬毛；萼长约 7 毫米，裂片线状披针形；花冠淡紫色，长约 1.5 厘米。蒴果与宿存萼近等长或者稍长。花期春季。

产海南（定安）、广西（贺县）、云南（景洪、勐腊、普洱）。生于田野，常见。印度东南部和缅甸等地也有分布。

罗献瑞在《海南植物志》中，将中国科学院华南植物研究所存的刘心祈 23138 采自海南定安标本定为 *Hygrophila phlomoides* Nees，作者在哈佛大学阿诺德标本馆看到 B. Hansen 于 1982 年 12 月 8 日将同号标本定为本种。

3. 大花水蓼衣 (广州植物志)

Hygrophila megalantha Merr. in *Phil. Jour. Sci.* **12**: 110.1917; 广州植物志: 621.1956.

草本。高 30—60 厘米，直立，分枝，无毛；茎 4 棱形。叶狭矩圆状倒卵形至倒披针形，长 4—8 厘米，宽 8—15 毫米，先端圆或钝，基部渐狭，边全缘，侧脉纤细，不明显。花少数，1—3 朵生于叶腋内；苞片矩圆状披针形，顶端钝，长约 1 厘米，小苞片狭矩圆形，长约 6 毫米；萼长 1.2—1.4 厘米，裂片狭线状披针形，尾状渐尖，约与萼管等长，有短睫毛；花冠紫蓝色，长可达 2.5 厘米，外被疏柔毛，冠管下部圆柱形，上部肿胀，上唇钝，下唇短 3 裂。蒴果长柱形，长 1—1.5 厘米。花期冬季。

产广东（广州）、香港、福建（厦门）。生于江边的湿地上。模式标本采自广州河南珠江边。

本种与 *H. salicifolia* Nees 相近，只是个体大，不少人认为应予归并。