

本种原产美洲, 现在中国台湾、菲律宾群岛、马里安纳群岛 (Marianne Islands) 和加罗林群岛 (Caroline Islands) 等地归化。

产台湾 (兰屿、屏东、嘉义、台南)。云系归化, 并无实证, 很可能是早期在太平洋两岸隔离分化所致。

17. 恋岩花属 *Echinacanthus* Nees

Nees in Wall. Pl. As. Rar. **3**: 75, 90.1832 et in DC. Prodr. **11**: 168.1847; Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. 2 (1—2): 1064, 1080.1865; C. B. Clarke in Fl. Brit. Ind. **4**: 414.1884; Lindau in Engler, Pflanzenf. IV. **3b**: 301.1895; H. S. Lo et D. Fang, Acta Bot. Yunnanica **7** (2): 137—138.1985; J. R. I. Wood in Edinb. Journ. Bot. **51** (2): 185.1994.

稀疏草本或灌木, 叶对生, 近等大或不等大, 多少具齿, 聚伞花序或两花连同节间组成腋生或顶生的圆锥花序。苞片狭, 小苞片无。花中等, 被腺毛, 花萼深5裂, 裂片近相等, 果时直立, 花冠漏斗形, 紫色, 稀黄色, 冠管圆筒形, 喉部扩大呈钟形, 冠檐近辐射对称, 5裂, 冠檐裂片近等大, 旋转排列; 雄蕊4, 2强, 内藏, 花丝基部成对合生, 花药背着, 药隔被毛, 花药2室, 箭形, 广椭圆形, 矩圆形, 被硬毛, 药室平行, 基部有芒刺状距或无距, 花粉粒长球形, 有多棱, 3孔; 子房2室, 每室有4—8粒胚珠, 花柱线状, 柱头2裂, 后裂片消失。蒴果圆柱形, 自基部生多粒种子。隔壁完全, 贴生。种子由珠柄钩支撑, 心状近圆形, 压扁。

约10种, 其中6种分布于东喜马拉雅 (尼泊尔、锡金) 至印度, 泰国、印度尼西亚爪哇也有。我国有3种。全分布广西, 仅1种分布至贵州南部。

属名模式: *Echinacanthus attenuatus* Nees

分种检索表

1. 药室基部有2个芒刺状的距; 花冠紫色, 外面无毛或近无毛。
 2. 草本; 网脉在背面明显凸起; 叶通长圆形至披针形, 上面糙伏毛, 很少近无毛, 背面只少在脉上被糙伏毛; 叶柄通常长于叶片的1/2 1. 长柄恋岩花 *E. longipes* H. S. Lo et D. Fang
 2. 灌木; 网脉两面均不明显; 叶椭圆形或卵状椭圆形, 两面无毛, 叶柄短于叶片的1/2 2. 龙州恋岩花 *E. longzhouensis* H. S. Lo
1. 药室基部仅1个芒刺状距; 花冠黄色, 外面被柔毛; 叶背面侧脉腋内簇生髯毛 3. 黄花恋岩花 *E. lofouensis* (Lévl.) J. R. I. Wood