

略被刚毛，边缘具纤毛。花冠向上钟形，基部管形，长2.5厘米，径宽1.5厘米，外面光滑无毛，冠檐5裂，冠檐裂片几不等，三角状圆形。光滑无毛。雄蕊4，2强，花药矩圆状线形。花盘圆柱形，长1毫米，宽0.3毫米。子房光滑无毛。蒴果长1.2厘米，具4种子，珠柄钩急尖；种子椭圆形，扁，长2.5毫米，宽1.5毫米，密被伏贴刚毛。

产我国台湾（台北、新竹、南投、高雄、花莲）。（模式标本未见）

3. 琉球兰嵌马蓝（新拟）

Parachampionella tashiroi (Hayata) Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. ; Afd. Naturk. sect. 2. **41** (1): 286.1944. — *Strobilanthes tashiroi* Hayata Ic. Pl. Formosa **9**: 85.1920.

草本，茎基部匍匐，自生根的节逐渐上升，部分上升至25—30厘米高，4棱，光滑无毛。叶矩圆状披针形或披针形，长8—9厘米，宽3厘米，顶端渐尖，基部突然或逐渐变成柄，边缘具钝而瘦的锯齿或近全缘，两面近光滑无毛，下面在脉上被细硬毛，膜质。总状花序，少花，顶生，花梗长1—2毫米，具1苞片，2小苞片；苞片匙形，长13毫米，小苞片线形，与花萼等长，长1厘米，宽1.5毫米，钝，被硬毛。花萼2深裂，上唇部分3裂，下唇2裂，裂片长13毫米，稍被硬毛。花冠钟形，长2厘米，冠檐5浅裂。雄蕊4，2强，花丝具硬毛。花柱光滑无毛。花盘长1毫米；子房倒卵状圆柱形，光滑无毛，长2.5毫米。蒴果长13毫米，光滑无毛，具4种子，珠柄钩线形，长3毫米，渐尖；种子非常扁，被短硬毛，长1.5毫米，宽1.7毫米。

产我国台湾（台东、台北、新竹）。日本冲绳也有分布。模式标本采自日本冲绳。

据载本种与 *Strobilanthes formosana* S. Moore 很近似，区别在：其很狭的线形萼裂片，全无苞片，和叶特别狭而小。作者未见本种模式标本，仅在哈佛大学标本馆看到 J. Murata 采自冲绳之永良部岛（Isl. Okinoerabu）一张原定名为本种的标本，但与曲茎兰嵌马蓝 *Parachampionella flexicaulis* (Hayata) C. F. Hsieh et T. C. Huang 相近似。而本种在《台湾植物志》第一、第二版均未列，其在台湾的分布恐有问题。Bremek-camp 认为（1944）台湾有本种，未经核实，暂先志此，待查看更多有关地区标本后，再作处理。

属群 3.

22. 山一笼鸡属 *Gutzlaffia* Hance

Hance in Hooker, Journ. Bot. & Kew. Gard. Misc. **1**: 142.1849;
Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 891.1936. — *Pseudostenosiphonium*
Lindau in Naturk. Pflzfam., **4.3b.**, 303.1897. Bremek. in Verh.

Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. 2 sect. **41** (1): 154.1944.

多年生草本；茎基部木质。叶对生，等大，近革质，椭圆形到长椭圆形，上面粗糙或略粗糙，被糙硬毛，全缘，具糙硬缘毛。花序短穗状近头状，顶生和腋生。花整齐；苞片近革质，披针形，被糙硬毛，小苞片小，线形；萼裂片5，线形，近相等；花冠辐射状，花冠筒膨大而向一面肿胀，冠檐5裂，冠檐裂片近相等；雄蕊2；花粉粒圆球形，具刺状纹饰，3孔，刺均匀分布；子房狭长圆形，每室具2胚珠；花柱外露，弯曲。蒴果纺锤形，有种子4颗。种子近圆形，两面凸起，被细柔毛，后脱落成无毛，有光泽，基区较大。

分布于泰国、中南半岛至我国西南和华南，可能为单型，在我国产于江西、广东、云南、贵州和四川。

属名模式：山一笼鸡 *Gutzlaffia aprica* Hance (NCU-3 失载)

1. 山一笼鸡 (中国高等植物图鉴) 野古蓝 (植物研究) 图版 13: 1—5

Gutzlaffia aprica Hance in Hooker, Journ. Bot. & Kew Gard. Misc. **1**: 142.1849; Limpr. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **12**: 108.1922; S. Moore in Journ. Bot. **63**: 167.1922; Merr. in Sunyatsenia **1**: 168.1933; Hand.-Mazt. Sym. Sin **7**: 891.1936; Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Naturk. 2 sect. **41** (1): 154.1944; 中国高等植物图鉴 **4**: 157.t. 5728.1975; L. A. Lauener in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **38** (3): 477.1980.——*Phlebophyllum apricum* (Hance) Benth. in Hook., Journ. Bot. & Kew Gard. Misc. **5**: 131.1853.——*Strobilanthes aprica* (Hance) T. Anders. in Benth. Fl. Hongkong. 262.1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 239.1890; R. Ben. in H. Lec., Gén. Indo-Chine **4**: 666.1935.——*Gutzlaffia cavaleriei* Lév. in Fedde Repert. Sp. Nov. **12**: 18.1913. & Fl. Kouy-Tchéou : 21.1914; Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Naturk. 2 sect. **41** (1): 272.1944.——*Strobilanthes mairei* Lév. Cat. Fl. Yunnan : 6.1915.——*Strobilanthes dielsiana* W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **8**: 207.1914.——*Gutzlaffia dielsiana* (W. W. Sm) S. Moore in Journ. Bot. **63**: 167.1925; Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Naturk. 2 sect. **41** (1): 155.1944.

1a. 山一笼鸡 (原变种)

var. ***aprica***

多年生直立草本，高可达70厘米；茎四棱形，节明显，基部木质化。倒生白色糙硬毛。叶对生，疏生，等大，近革质，椭圆形到长椭圆形，先端渐尖，基部圆或宽楔形，上面粗糙或略粗糙，被糙硬毛，全缘，具糙硬缘毛，侧脉5—6对，中肋及侧脉被糙硬毛，下面被黄色贴伏绒毛；叶柄长约3毫米，被疏柔毛。穗状花序头状，顶生和腋生。生于上部者近无梗，生于下部者具长达7厘米总梗；苞片近革质，披针形，长