

13—15 毫米，先端渐尖，粗糙，被糙硬毛，小苞片线形，长约 1 毫米，略粗糙，有白色缘毛；萼裂片 5，与苞片相似，近等长或稍短，有缘毛；花冠紫色或白色，长约 3.5 厘米，花冠筒狭，长 1.5 厘米，喉部膨大并一面凸起，内面有 2 列柔毛，冠檐裂片 5，几相等，近圆形，约长 5 毫米；雄蕊 2，外露，着生于喉的基部，花丝无毛，花药椭圆形，花粉粒圆球形，3 孔，具刺纹饰，刺均匀分布；子房狭长圆形，先端有柔毛，余无毛，花柱外露，弯曲，有柔毛。蒴果纺锤形，长约 1 厘米，有种子 4 颗。种子近圆形，两面凸起，被细柔毛，后脱落成无毛，有光泽，基区较大。

产江西、香港、广东、广西、贵州、四川和云南。生于海拔 2200 米以下的干旱疏林下或山坡灌丛。中南半岛、泰国也有。模式标本采自香港。

1b. 岩一笼鸡 (新拟) 岩野古蓝 (植物研究)

var. **glabra** (Imlay) H. S. Lo in Bull. Bot. Res. 1 (4): 102. 1981. — *Strobilanthes apricus* (Hance) T. Anders. var. *glaber* Imlay in Kew Bull. 1939: 116.

小灌木；叶除中脉外两面近无毛；萼裂片被短柔毛或近无毛。

产广东 (阳春)。泰国也有。模式标本采自泰国。

23. 南一笼鸡属 *Paragutzlaffia* H. P. Tsui

H. P. Tsui in Acta Bot. Yunn. 12 (3): 273. 1990; 中国种子植物特有属: 54—56. 1994.

草本。叶对生，不等大，卵形或披针形，边缘具圆锯齿。假穗状花序伸长 3，顶生或腋生。花小，成对着生；苞片匙形或披针形，与萼等长或稍短，小苞片短于苞片；花萼 5 裂，裂片线状披针形，近等大，连同苞片、小苞片被腺毛或柔毛；花冠漏斗状，冠管扭转 180°，一面膨大，冠檐 2 唇形，上方 2 裂片几裂至基部，下方 3 裂片至裂片 1/3 处；能育雄蕊 2，着生于花冠筒下部，花药 2 室，药室卵状长圆形；不育雄蕊 2，细小；花粉粒圆球形，具 3 孔，刺状纹饰，刺成纵行排列；子房狭长圆形，每室具 2 胚珠；花柱外露，弯曲。蒴果纺锤形，有种子 4 颗。种子两侧极压扁，近圆形或宽卵圆形，基区微小。

2 种，为我国华中至横断山区和云南高原特有。我国分布于湖北、四川、贵州、云南。

属名模式: *Paragutzlaffia henryi* (Hemsl.) H. P. Tsui (NCU-3 未载)

本属与山一笼鸡属 *Gutzlaffia* 相近，其区别在于：假穗状花序伸长，花冠 2 唇形，雄蕊 4，下方 2 枚不育，花粉粒圆球形，刺状纹饰成纵行排列，对生叶不等大，种子两侧极压扁及基区小而不同。

分种检索表

1. 花序上花密集呈柱状, 花序上被头状腺毛; 花通常淡黄色或白色 1. 南一笼鸡 *P. henryi* (Hemsl.) H. P. Tsui
 1. 花序上花疏松呈节状, 花序上决不被头状腺毛, 花紫色或粉红色 2. 异蕊一笼鸡 *P. lyi* (Lévl.) H. P. Tsui

1. 南一笼鸡 (云南种子植物名录) 图版 13: 6—12

Paragutzlaffia henryi (Hemsl.) H. P. Tsui in Acta Bot. Yunn. **12** (3): 274.1990; 横断山区维管植物 (下册): 1872—1873.1994; 中国种子植物特有属: 54—56.1994. — *Strobilanthes henryi* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 240.1890. — *Gutzlaffia henryi* (Hemsl.) C. B. Clarke ex S. Moore in Journ. Bot. **63**: 167.1925; 中国高等植物图鉴 **4**: 158. 图 5729.1975; 云南种子植物名录 (下册): 1676.1984. — *Gutzlaffia forrestii* S. Moore in Journ. Bot. **63**: 167.1925. — *Gutzlaffia anisandra* (R. Ben.) Hand.-Mazz. var. *drosothyrsa* Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 891.1936.

多年生草本或半灌木。通常高约 35 厘米。茎 4 棱, 多分枝, 纤细, 被倒生柔毛, 后渐脱落。叶对生, 不等大, 草质, 叶柄长 1.5—3.5 (—4.5) 厘米, 叶片卵形或卵状披针形, 长 3—7 (—9) 厘米, 宽 2—3 (—4.5) 厘米, 先端急尖或渐尖, 基部圆或宽楔形, 常下延, 上面被稀疏糙硬毛, 有时被长柔毛, 但不久脱落, 线形钟乳体密集, 背面被疏柔毛, 脉上较密, 侧脉 5—6 对, 背面显著, 边缘具圆锯齿。假穗状花序顶生或腋生, 伸长, 通常长 4.5—8 厘米, 最长可达 20 厘米并有分枝, 每节有 2 对生的花; 苞片线状披针形或匙形, 长 6—7 毫米, 宽 1—2 毫米, 连同小苞片, 花萼及花梗被腺毛; 小苞片线形, 短于苞片; 花萼长 11 毫米, 裂片 5, 线形, 近相等, 长 6—7 毫米; 花冠淡紫色, 有时白色, 长 17—23 毫米, 花冠管筒状, 长约 3.5 毫米, 喉部一面膨大, 冠檐 2 唇形, 上 2 裂片圆形, 径约 2 厘米, 下 3 裂片稍大, 先端凹缺, 能育雄蕊 2, 外露, 着生于喉下部, 花丝长约 3.5 毫米, 被微柔毛, 花药 2 室, 药室长卵圆形; 不育雄蕊 2, 细小, 着生于能育雄蕊内侧; 花粉粒圆球形, 具 3 孔, 刺状纹饰, 刺成纵行排列; 子房长圆形, 每室具 2 胚珠; 花柱外露, 弯曲, 先端膨大成柱头。蒴果纺锤形, 长 8—10 毫米, 有种子 4 粒。种子两侧极压扁, 近圆形, 密被细长柔毛, 基区微小。

产湖北 (宜昌)、江西 (龙南)、广东 (广州)、香港、广西 (武鸣)、四川 (西昌)、重庆 (奉节)、贵州 (清镇) 和云南 (昭通、德钦、中甸、丽江、鹤庆、大理、武定、昆明、蒙自、砚山)。生于海拔 1000—2200 米的山坡。模式标本采自湖北宜昌。

2. 异蕊一笼鸡 (云南种子植物名录)

Paragutzlaffia lyi (Lévl.) H. P. Tsui in Acta Bot. Yun. **12** (3): 274.1990; 横断山区维管植物志 (下): 1872—1873.1944; 中国种子植物特有属: 54—56.1994. — *Ruelia lyi* Lévl. in Fedde Repert. Sp. Nov. **12**: 21.1913 et Fl. Kouy -Tchéou 20.1914.