

暂存疑。

属群 7.

27. 板蓝属 *Baphicacanthus* Bremek.

Bremek. in Verh. Ned Akad. Wetensch. Afd. Naturk. Sect. 2.41
(1): 190.1944.

一次性结实植物，具等叶性。叶具长柄。花无梗，对生，组成腋生和顶生，伸长的穗状花序；苞片叶状，具羽状脉，倒卵形，顶端圆，基部狭窄，具短柄，最下部的比花萼长，其余逐渐减小；最下部的花的小苞片比花萼稍短，其他小苞片逐渐减小，上部的花小，小苞片线形；萼不等5深裂，裂片线形，急尖，后裂片较大；花冠堇色，玫瑰红色或白色，花冠圆筒形，顶端内弯，喉部扩大呈窄钟形，稍稍弯曲，不扭弯，冠管短圆柱形，狭钟形的喉为冠管的两倍长，支撑花柱的毛排列成2列，冠檐5裂，裂片等大，倒心形，旋转状排列；雄蕊4枚，2长2短，内藏，直立，花丝无毛，花药直立，顶端具短尖，药室侧面平扁，无不育雄蕊，内方雄蕊之间的药隔膜有微缺；花粉粒大（据：邓良 8754，广东从化），椭圆形，带状纹饰，带上有小点和2条波状弯曲的脊；花柱光滑无毛，子房上半部被毛，每室有胚珠2粒。蒴果棒状，上端稍大，长约2.2厘米，稍具4棱；种子每室2粒，具小基区，基区以外散生稍明显的毛。

为单种属，只有1种，分布于印度东北部、缅甸、泰国、中南半岛至我国南亚热带线以南，北达川、黔、湘、赣、闽、浙的南部。因叶含蓝靛，可作染料，在中国南方、中南半岛和印度北方曾广泛栽培，现仍有少数民族栽培染土布。原产地应在我国南方。

属名模式：*Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek.

1. 板蓝（海南植物志） 马蓝（古籍，中国高等植物图鉴，台湾植物志） 图版16: 1—5

Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek. in Verh. Ned Akad. Wetensch. Afd. Naturk. Sect. 2.41 (1): 59, 190.1944; 海南植物志 3: 548.1974; C. F. Hsieh et T. C. Huang in Fl. Taiwan. 4: 623.1978.——*Goldfussia cusia* Nees in Wall., Pl. As. Rar. 3: 38.1832 et in DC. Prodr. 11: 175.1847.——*Strobilanthes cusia* (Nees) O. Kuntze in Rev. Gen. 499.1891; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 895.1936; 中国高等植物图鉴 4: 160.1975; Fl. Taiwan ed. 2.4: 678.pl. 210.1998.——*Ruellia indigofera* Griff. Journ. Travel. Ind.: 327.1847.——*Strobilanthes flaccidifolius* Nees in DC. Prodr. 11: 194.1847; T. Anders. in Journ. Linn. Soc. Bot. 9: 481.1866; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brist. Ind. 4: 468.1884; Hook in Curtis's Bot. Mag. 113: t 6947.1887; R. Ben.