

ulatus var. *edgworthianus* (Nees) C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 453.1884; R. Ben. in H. Lec., Fl. Gén. Indo-Chine 4: 674.1935; Hand.-Mazz. in Oest. Bot. Reilsch. 87: 125.1938; Yamazaki in Hara Fl. E. Him. 304.1966.

多年生草本。茎4棱形，无毛，节处膝曲。叶在下部的近等大，披针状长圆形，渐尖，基部楔状渐狭而耳状环抱，被微毛，在顶部的不等大，心状卵形，抱茎，不对称，略具齿或近于全缘，较小的为心形，长3—4厘米，较大的倒心状楔形，中央微凹缺，叉开，具短尖头，反折，被长缘毛，长为较小的2倍。穗状花序腋生，圆柱形，长5—9.5厘米，具1—2厘米的短梗，花密集，基部间断；苞片在下部的2—3对不育而疏离，近心形，急尖，反折，余为覆瓦状排列，长9毫米，近顶端的宽6毫米，微凹裂，裂片圆形，在凹处有短尖头小，反折，具脉状条纹，基部楔形，内面被短柔毛，背面被长硬毛，边有长缘毛。花冠长1.5—2厘米，无毛，蓝色。蒴果与萼等长(?)，披针形，灰白色，基部较狭，中部具种子4粒。

产云南(墨江、普洱)。分布于印度北方、喜马拉雅和中南半岛。

据 P. R. Shekya (在 H. Hara, Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 142.1982.) 认为本种与 *Perilepta auriculata* (Nees) Bremek. 为同一种。

4. 锈背耳叶马蓝(新拟) 锈背马蓝(广西植物)

Perilepta ferruginea (D. Fang et H. S. Lo) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. — *Strobilanthes ferruginea* D. Fang et H. S. Lo, in Guihaia (广西植物) 17 (1): 29.1997.

灌木，高约2米。叶不等大，阔椭圆形至椭圆形，稀卵状椭圆形，大叶长13—18厘米，小叶长4—7.5厘米，上半部有疏浅钝齿，干时下面多少呈锈色。穗状花序腋生，长1—2.5厘米，间断，每个花序着花1—3朵；苞片椭圆形至长圆形，长约3.5—4毫米，宿存；花互生；花萼长9毫米，2唇形，下唇2裂几达基部，上唇3裂片长约4毫米，所有裂片均为长圆形；花冠长3—3.5厘米，外面无毛，喉部紫色，檐部白色，冠檐裂片5，长约5毫米；雄蕊4，花丝均疏被硬毛。(仅见模式标本照片)

产广西(龙州)。生于石灰岩山、密林下。模式标本采自广西龙州崙岗。

据方鼎和罗献瑞文载：“本种与 *Strobilanthes griffithiana* (Nees) T. Anders. 近缘，但那种叶宽披针形，干时下面不为锈色；穗状花序长达20厘米，被粘质短柔毛；苞片狭三角形，长25毫米，花冠黄色。”作者仅见模式标本照片，但据其描述，花萼为2唇形，应属本属，但叶具柄，且不抱茎，与本属其他种类明显不同，暂先根据花萼特征移至本属，待看到模式标本进行比较研究，并做花粉观察后，再定。

5. 崙岗耳叶马蓝(新拟) 崙岗马蓝(广西植物)

Perilepta longgangensis (D. Fang et H. S. Lo) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. — *Strobilanthes longgangensis* D. Fang et H. S. Lo, in Guihaia (广西植物) 17