

(1): 33.1997.

亚灌木，高逾 40 厘米。除花外无毛。叶不等大，狭椭圆形，稀卵状椭圆形，大叶长 6—11.5 厘米，小叶长 (1.5—) 3—8.5 厘米，基部下延，边有浅齿，侧脉每边 4—6 条。穗状花序腋生，长 2—4 厘米，不分枝，着花 1—5 朵；苞片对生，疏离，狭三角形，长 2—4 毫米，先端急尖 1 枚不孕，宿存；花萼长约 5 毫米，2 唇形，上唇 3 浅裂，下唇 2 裂至基部，裂片 2 毫米；花冠紫色，长逾 2.5 厘米，外面无毛，冠檐裂片 5，长约 4 毫米，有凹缺；雄蕊 4，2 强，花丝全被疏柔毛；子房无毛，花柱被硬毛。(仅见模式标本照片)

产广西 (龙州)。生石灰岩山坡。模式标本采自广西龙州崙岗。

据方鼎和罗献瑞文载：“本种以侧脉每边 4—6 条，穗状花序长达 4 厘米，不分枝，无毛，苞片稍短于花萼，先端急尖，萼长约 5 毫米，有凹缺，而与 *Strobilanthes griffithiana* (Nees) T. Anders. 不同。”作者仅见模式标本照片，根据其描述，花萼为 2 唇形，应属本属，但叶具柄，且不抱茎，与本属其他种类明显不同，暂先按花萼特征移至本属，待看到模式标本进行比较研究，和做花粉观察后，再定。

6. 龙州耳叶马蓝 (新拟) 龙州马蓝 (广西植物)

Perilepta longzhouensis (H. S. Lo et D. Fang) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. — *Strobilanthes longzhouensis* H. S. Lo et D. Fang, in *Guihaia* (广西植物) 17 (1): 34—35.1997.

灌木，高达 2 米；茎紫棕色。叶革质，卵形或披针状卵形，长 3—15.5 厘米，宽 2.5—6 厘米，基部楔形，边缘常有不明显小锯齿或浅波状，无毛，侧脉每边 5—7 (—9) 条。穗状花序腋生；花密，常互生；苞片披针形，长 5—6 毫米，被短柔毛，宿存；花萼长约 8 毫米，2 唇形，上唇 3 深裂，下唇 2 裂至基部，裂片长约 6 毫米；花冠淡紫色，长 3—3.5 厘米，外面无毛，冠檐裂片 5，长约 5 毫米；雄蕊 4，2 强，前对花丝被长柔毛；子房无毛，花柱中部以上被长柔毛。(仅见模式标本照片)

产广西 (龙州、大新)。生石灰岩山。模式标本采自广西龙州崙岗。

据罗献瑞和方鼎文载：“本种花互生，花萼 2 唇形，而与 *Strobilanthes griffithiana* (Nees) T. Anders. 近缘，但那种叶阔披针形，背面脉上有微毛；穗状花序和花萼被粘质短柔毛。”作者仅见模式标本照片，根据其描述，花萼为 2 唇形，应移本属，但叶具柄，且不抱茎，与本属其他种类明显不同，暂先依据花萼特征移至本属，待看到模式标本进行比较研究，和做花粉观察后，再定。

7. 折苞耳叶马蓝 (新拟) 折苞马蓝 (植物分类学报)

Perilepta refracta (D. Fang, Y. G. Wei et J. Murata) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. — *Strobilanthes refracta* D. Fang, Y. G. Wei et J. Murata in *Acta Phytotax. Sin.* 38 (2): 185—187.2000.