

32. 红毛蓝属 *Pyrrothrix* Bremek.

Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. sect. 2. 41

(1): 209. 1944.

植株几全被锈红色刚毛，稍异叶性。叶收缩成柄。花序顶生或腋生，具花序梗，穗状花序短缩或相当长，苞片线状长圆形，或匙形，具纤毛，羽状脉，与花萼几等长，宿存；花单生于苞腋，具小苞片，小苞片线形，几钝；花萼几相等5深裂，裂片线形；花冠颜色不详，扭弯，花冠管圆柱形，喉部扩大成钟形，有两列支撑花柱的毛，冠檐裂片近相等，圆形。雄蕊4，2强，内藏，全部直立，花丝全部被刚毛；花药直立，顶端钝，两侧扁。花粉粒椭圆形，具节条状纹饰，节条有隔。子房稀疏地被簇毛，每室有2胚珠，花柱光滑无毛。蒴果纺锤形，有短芒尖，几无簇毛，具4粒种子，珠柄钩针状伸出。种子无基区，几全被坚硬毛。

本属约13种，分布于印度东北部（卡西山区）、中南半岛至印度尼西亚苏门答腊。我国约3种，全见于云南。

属名模式：*Pyrrothrix deliensis* Bremek. (NCU-3 未载)

分 种 检 索 表

1. 苞片线状的匙形；花序顶生。

2. 由2—3花连同密被红褐色刚毛线状匙形的苞片组成

..... 3. 红毛蓝 *P. rufo-hirta* (C. B. Clarke) C. Y. Wu et C. C. Hu

2. 由8—10朵花密集于长2—8厘米、被硬毛的花序轴上，呈顶生头状花序

..... 1. 异色红毛蓝 *P. heterochroa* (Hand. -Mazz.) C. Y. Wu et C. C. Hu

1. 苞片小，圆形，具长爪 2. 泰北红毛蓝 *P. hossei* (C. B. Clarke) C. Y. Wu et C. C. Hu

1. 异色红毛蓝（新拟）异色紫云菜（云南种子植物名录）

Pyrrothrix heterochroa (Hand. -Mazz.) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. ——
Strobilanthes heterochrous Hand. -Mazz. in Oest. Bot. Reilsch. 87: 125. 1938; 云南植物
名录（下册）：1686. 1984.

茎高60厘米，多分枝，4棱形，密被倒生黄柔毛，下部光滑无毛，枝节间伸长达12厘米，上部叶椭圆形或卵状披针形，长4—8.5厘米，宽1—2厘米，（宽为长的1/2—1/4），基部渐狭，叶柄为叶片的1/4长，边缘具密而细锯齿，干时淡棕色，稍厚，具细条纹，上面脉下陷，具泡状糙伏毛，下面灰色，被绒毛状硬毛，侧脉每边8—10条，稍隆起。花8—10朵密集于长2—8厘米、被硬毛的花序轴上，呈顶生头状花序。