

1—3 花，约长 1—4 厘米，被微柔毛，苞片凹，稍被纤毛，最外方一对几叶状，线状披针形，先落，内方 4 枚或更多，宽卵形，早落，有时持续到开花后；萼裂片不等，线形，约长 1 厘米，为花冠短 1/3，有时稍具长硬毛；花冠直，外面不明显被微柔毛，冠管逐渐扩大，长 3—3.5 厘米，冠檐裂片 5，圆形-卵形，钝而微缺；雄蕊 4，内藏，长花丝下部宽，有纤毛，短花丝无毛。花粉粒长球形，具有隔条形纹饰（取自 Zuzuki-Tokio ST. 19066, Taihokusyu, Bunzannngun）。蒴果矩圆形，为花萼裂片的 2 倍长。种子卵圆形，扁，被紧贴长柔毛。

产台湾〔台北、观音山（Kwanyinshan）、阳明山、宜兰、南投、凤凰谷、桃园、台中〕。模式标本采自台湾。

6. 腺苞金足草（中国种子植物·数据库光盘） 腺苞马蓝（广西植物）

Goldfussia glandibracteata (D. Fang et H. S. Lo) C. Y. Wu, Seed Plants of China·A Data Base Disc. (中国种子植物·数据库光盘) 1999.——*Strobilanthes glandibracteata* D. Fang et H. S. Lo, in Guihaia (广西植物) 17 (1): 38—39.1997.

草本，高超过 40 厘米，叶卵状椭圆形，稀狭卵形或披针形，大叶长 5.5—12.5 厘米，小叶长 2—3.5 厘米，边缘有浅锯齿。头状花序生于上部叶腋和枝端；花序梗被 2 列短柔毛，先端稍增粗；苞片椭圆形至卵状椭圆形，先端急尖或钝，背面具节腺状短柔毛，早落或凋落；萼不等 5 裂几裂至基部，外被具节腺状短柔毛；花冠淡紫色，长约 3.5 厘米，外面近无毛，冠檐裂片 5，长 3 毫米，微凹；雄蕊 4，长花丝不等长，直立，短花丝内弯，花药近球形；子房和花柱被锈色腺状短柔毛。

产广西（凌云）。模式标本采自广西凌云。

据原始文献载：“本种与球花马蓝 *Strobilanthes pentstemonoides* Nees [= *Goldfussia pentstemonoides* (Nees) T. Anders] 极为相近，但后者叶椭圆形；花序梗常被腺状短柔毛；苞片近圆形，先端圆，和花冠外均无毛。”作者因未见模式标本，而草本植物形态特征变异大，认为很可能与球花马蓝同一种，但暂且予保留。

7. 聚花金足草（云南种子植物名录）

Goldfussia glomerata Nees in Wall. Pl. As. Rar. 3: 88.1832 et in DC. Prodr. 11: 173.1847; Bot. Mag. 68: Tab. 3881.1841.et (sub nomine *glomerata* Nees var. *speciosa* Hook.) 80: Tab. 4767, 1854; Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. sect. 2.41 (1): 230, 231, et 234.1944; 云南种子植物名录（下册）: 1675.1984.——*Strobilanthes glomerata* (Wall.) T. Anders. in Jour. Linn. Soc. Bot. 9: 475.1867; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 448.1884.

多年生草本或灌木，高达 1 米，茎木质化，节膝曲而旋扭，被长而硬的刚毛。叶不等大，大叶卵形，急尖或尾尖，边缘有不等齿牙状圆齿，多脉，基部阔楔形，歪斜，两侧不等，长 12.5—16.5 厘米，宽 6—8 厘米，具柄，柄长 1—2 厘米，小叶甚小，长 3