

产广西（凭祥）、云南（河口、金平）。越南北方也有。生于山坡林下。模式标本采自越南北部（Bavi）三位山（Balansan. 3490）。

10. 鼠尾紫云菜（新拟）

Strobilanthes myura R. Ben. in Bull. Mus. Hist. Naturk. Par. **28**: 95.1922; Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. Sect. 2. **41** (1): 281.1944.

灌木（?），嫩枝近圆柱形，光滑无毛。叶具柄，叶片卵形或披针形，长达16厘米，宽6厘米，基部急尖，顶端渐尖，部分不等，边缘具圆齿状齿牙，两面光滑无毛，侧脉8—11条。花对生，无柄，疏松的穗状花序腋生和顶生；苞片长圆状三角形，急尖，光滑无毛，边缘疏被纤毛，长7毫米，宽2毫米；小苞片披针形，长4毫米，宽1毫米，花萼矩圆形，长8毫米，宽2毫米，渐尖，光滑无毛，小苞片和花萼边缘疏有纤毛。花冠长5.5厘米，冠管基部圆柱形，上部扩大，指状。雄蕊4，花丝直立，稀被疏柔毛，花药矩圆形。花粉粒椭圆形，有肋带。花柱稀被长柔毛。蒴果不详。（模式标本未见）

产贵州独山（模式标本产地）。

11. 沙坝紫云菜（新拟）

Strobilanthes peteloti R. Ben. in Bull. Soc. Bot. France : 731.1933; id in H. Lec. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 676.1935.

草本。高0.5—1米；幼茎近4棱形，具沟或槽，被红棕色毛，后变近圆形。上部叶有短柄或无柄，卵状披针形，顶端短渐尖，向基部渐狭，边缘具圆锯齿，两面无毛，具密线状钟乳体，长7—12厘米，宽3.5—6厘米，下部叶具柄，柄长1—1.5厘米，侧脉每边6—7对，多少明显平行。穗状花序顶生和腋生，花序相当长，长约6—7厘米，单生于叶腋，较细，无总花序梗，干时发黑，花序轴被红棕色毛，苞片对生，略覆瓦状排列，线状披针形，顶端长渐尖，具1脉，边缘具微白色毛，长1.8厘米，宽1毫米，与花萼裂片顶端同被红棕色毛；花萼裂片线形，长14—18毫米，边缘具很短的毛；花冠长3厘米，冠管白色至蓝色，基部圆柱形，向上扩大，冠檐裂片顶端凹；雄蕊4，内藏，花粉粒药椭圆形，具纵向肋条带纹饰；花柱，被散生毛，子房光滑无毛。（模式标本未见，鉴定依据 R. Ben. 1935 的描述）。

产云南（屏边、河口）。越南也有。模式标本采自越南北方黄连山沙坝。

12. 多脉紫云菜（云南种子植物名录）

Strobilanthes polyneuros C. B. Clarke ex W. W. Sm. in Not. Bot. Gard Edinb. **10**: 198.1918; Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. Sect. 2. **41** (1): 283.1944; C. Y. Wu, 云南种子植物名录（下册）: 1686.1984.

草本。高1.8米；茎木质化，粗壮。上部叶无柄或有粗短柄，叶片长13—30厘米，宽5—11厘米，椭圆形或宽披针形，顶端具长渐尖，基部楔形，边缘近规则锯齿，干时