

9毫米，宽1.5毫米，顶端和上部边缘被黄色多节长柔毛。花冠长4厘米，淡蓝色，冠管基部圆柱形，上部指状，部分弯曲。雄蕊4，花丝直立，花药矩圆形。花粉粒椭圆形，具肋带。花柱稍被柔毛；蒴果长9毫米，光滑，顶端有柔毛。

产云南（昆明、大理、漾濞）。生于海拔1900—2300米的林中急流边。模式标本采自云南昆明长虫山。

15. 截头紫云菜（广西植物）

Strobilanthes truncata D. Fang et H. S. Lo, in *Guihaia* (广西植物) **17** (1): 31.1997.

草本，高约3米，除花序和花外无毛。叶厚纸质，不等大，阔卵形，稀椭圆形，卵形至卵状椭圆形，大叶长10—19厘米，小叶长宽3.5—7厘米，边有齿，叶下面钟乳体沿中脉分布。穗状花序腋生和顶生，长3—26厘米，间断；苞片椭圆形，早落，小苞片近线形，长8毫米，先端截平，有时近圆形，宿存；花萼长8—10毫米，2唇形，下唇2裂几达基部，上唇3半裂，裂片长5—6毫米；花冠外面白色而无毛，长3.5—5厘米，冠檐裂片5，长5—7毫米，微凹；雄蕊4，2强，前对花丝和花柱疏被短硬毛。

产广西（那坡、凭祥）。生于石灰岩山、村边，海拔900—1300米。模式标本采自广西那坡。

据原描述：本种与产于泰国的 *Strobilanthes albo-viridis* Imlay 接近，但那种枝，中脉下面和叶柄有微毛；花序梗有腺毛；苞片线状长圆形，密被腺质缘毛；花萼基部白色，先端绿色，下唇2裂，裂片长6毫米。

属群 11.

38. 四苞蓝属 *Tetragoga* Bremek.

Bremek. in *Verh. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. Sect. 2.* **41** (1): 299.1944.

草本，一次性结实。叶异型，被褐色或锈红色长硬毛，具叶柄，上面具小而明显条形钟乳体。穗状花序短缩，顶生或腋生，具花序梗。苞片4，自基部至下部的直立和在顶端部分开展，并由叶状组成的十字形，多脉和宿存。花单生于苞腋，小苞片条形，与花萼不等长或较其长，花萼不等5深裂，裂片条形，急尖。花冠颜色不详，扭弯，圆柱形花冠管至喉部扩大成钟形，为其2倍长，支撑花柱的毛排成2列，冠檐裂片几相等，圆形。雄蕊4，2强，全部直立和内藏，长雄蕊的花丝，具一行硬毛，比短雄蕊的花丝几乎长2倍，短雄蕊花丝光滑无毛，花药直立，顶端钝，药室向两侧扁平。不育雄蕊小，花粉粒椭圆形，具12条脊。子房光滑无毛或被簇毛，通常每室具2胚珠，花柱毛