

Fang et H. S. Lo in Guihaia (广西植物) 17 (1): 30.1997.

草本，节膝曲状，茎4棱，光滑无毛，两侧具沟。叶具柄或无柄，叶片长达12厘米，宽5厘米，披针形，基部变狭下延长楔形，顶端渐尖，边缘有小而疏离的齿牙，两面光滑无毛，侧脉5—7。花序疏松，聚伞花序，生枝顶。花互生，藏于两大苞片内。苞片对生，长长地下延至枝，苞片分离部分长3厘米，宽14毫米，顶端渐尖或急尖，边缘有小而疏离的齿牙，光滑无毛。小苞片长7毫米，宽0.75毫米，矩圆形，急尖，光滑无毛。花萼相等，矩圆形，急尖，光滑无毛。花冠长4厘米，基部圆柱形，上部扩大。雄蕊4，花丝直，花药矩圆形。花粉粒椭圆形，具脊。子房光滑无毛。花柱稀被疏柔毛。蒴果伸长，长达10毫米，光滑无毛。(未见模式标本及贵州标本，仅根据文献鉴定)

产贵州、广西(田林、龙州)。越南永福也有分布。模式标本(Cavalerie, 3118)采自贵州罗甸。

属群 13.

40. 假蓝属 *Pteroptychia* Bremek.

Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. Sect. 2. 41
(1): 303.1944.


草本，具异叶性。叶具柄或无柄，上面有大而密的条形钟乳体。穗状花序伸长，顶生或腋生；花单生于苞腋，苞片通常狭，稀叶状，1条脉或羽状脉，比萼短或与之等长，早落或近宿存；小苞片狭，比萼稍短，早落或近宿存；花萼近相等，5深裂，裂片狭条形，钝或尖；花冠蓝色，变成天蓝色或白色，扭弯，圆柱形花冠管在喉部扩大成钟形，并为其2倍长，支撑花柱的毛排列成两列，冠檐裂片几相等，宽圆形；雄蕊4，2强，直立和内藏，下延成2褶襞，褶襞两侧或一侧边缘被缘毛，花丝基部或几全部被微硬毛，外方的雄蕊比内方的几长2倍，花药直立，顶端钝，药室向侧面扁，不育雄蕊小或不明显；花粉粒近圆球形，具条和刺，模式种的花粉在赤道线上有5孔。子房光滑无毛或稍被毛，通常每室具2胚珠，花柱被毛。蒴果无记载。

记载5种。分布于我国南部、中南半岛、马来半岛，南到印度尼西亚苏门答腊。

属名模式：*Pteroptychia ridleyi* (Merr.) Bremek.

1. 曲枝假蓝(海南植物志) 图版 30: 1—8

Pteroptychia dalzielii (W. W. Sm.) H. S. Lo, 海南植物志 3: 547, 592.1974;
R. Ben. in H. Lec., Fl. Gén. Indo-Chine 4: 679.1935; “dalzielii”; 云南种子植物名录
(下册): 1683.1984.——*Acanthopale dalzeillii* W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb.



图版 30 1—8. 曲枝假蓝 *Pteroptychia dalzielii* (W. W. Sm.) H. S. Lo: 1. 植株一部分, 2. 花萼与苞片, 3. 小苞片, 4. 花萼裂片, 5. 花, 6. 花冠剖面示雄蕊, 7. 雄蕊, 8. 花粉粒。(余汉平、李爱莉绘)

11: 193.1919. — *Strobilanthes dalzielii* (W. W. Sm.) R. Ben. var. *inaequalis* R. Ben. in Not. Syst. 5: 109.1935; Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. Sect. 2. 41 (1): 305.1944. — ? *Championella dalzellii* (W. W. Sm.) Bremek. var. *glaber* R. Ben. in Bull. Mus. Naturk. His. Naturk. 28: 190.1922.

草本或灌木，茎直立，高达1米，枝细瘦，“之”字形曲折，略被微柔毛。上部叶无柄或近无柄，近相等或极不等，大叶长达14厘米，宽4厘米，小叶长2—5厘米，宽1—2厘米，卵形或卵状披针形，先端渐尖或急尖或稀钝，基部圆，边缘疏锯齿，干时膜质，侧脉每边5条，上面深绿色，有细线条，光滑无毛，背面灰白色，光滑无毛或脉上极稀被疏柔毛。顶生花序和上部腋生穗状花序长2—3厘米，有2—4花，疏生，花序轴稀被白色疏柔毛；苞片线形—披针形叶状；花梗不明显或极短。花萼长约1厘米，深裂至基部，裂片近线形，基部和裂片中肋密被白色疏柔毛。花冠长4.5厘米，冠管下部圆柱形，长约1厘米，外面微被疏柔毛，向上逐渐扩大，冠檐裂片圆，直径约8毫米。发育雄蕊4，稍伸出；花粉粒圆形具刺形（echinatum）纹饰。蒴果线状长圆形，两侧压扁，长约1.8厘米，宽约3.5毫米，顶端急尖，无毛；种子卵形，基区极小，基区以外密被紧贴稍皱曲的长毛。花期11月。

产广东（汕头、乳源、新丰、英德、怀集、阳春、始兴、高要、德庆、郁南、五华、新丰、深圳、惠阳、翁源、清远）、海南（保亭、陵水、琼中、白沙）、广西（凌云、田林、临桂、隆林）、湖南（江永）、云南（富宁、蒙自、屏边、金平、西畴）、贵州（独山）。模式标本（J. M. Dalziel 71）采自广东汕头。

族 2. 鳞花草族 *Lepidagathideae*

花冠2唇形，上唇微凹，下唇3浅裂；雄蕊4，花药2室，稀内方雄蕊1室。花粉粒通常圆形，纹饰细网状或平滑，具3孔沟，沟短而宽；柱头小而2浅裂。

亚族 1. 鳞花草亚族 *Lepidagathidinae* Bremek.

花萼4或5深裂。花冠略2唇形。雄蕊4，花药2室，平形相等，胚珠每室2粒。

41. 鳞花草属* *Lepidagathis* Willd.

Willd., Sp. Pl. 3 (1): 400.1800; Nees in DC, Prodr. 11: 249.1847;

* 鳞花草属 *Lepidagathis* Willd., 又名鳞球花属（台湾植物志）。