

边7—9条；叶柄长5—10毫米。穗状花序顶生和近枝顶侧生，卵形，长1—3厘米；苞片长圆状卵形，长约7毫米，顶端具刺状小凸起；小苞片稍狭，和苞片及萼裂片均在背面和边缘被长柔毛；花萼后裂片较大，披针状卵形，长约7毫米，前裂片中部以下合生；花冠白色，长约7毫米，喉部内面密被倒生、白色长柔毛，上唇直立，阔卵形，不明显2裂，下唇裂片近圆形；花药2室，药室邻接，斜叠生，花粉粒长球形，42（40—45）微米 $\times$ 28（26—29）微米，具3孔沟，沟长，两端尖，表面具网状雕纹；花柱无毛。蒴果长圆形，长约6毫米，无毛；种子每室2粒。花期早春。

产广东（阳春、深圳、广州、肇庆、台山、南海）、海南（保亭、白沙、澄迈和安定）、香港、广西（凌云、梧州、南宁）、云南（盈江、元阳、禄春、勐腊）。中南半岛至印度、喜马拉雅其他国家也有分布。通常生于海拔200—1500（—2200）米，近村的草地或旷野、灌丛、干旱草地或河边沙地。

据《海南植物志》载，全株入药，治眼病、蛇伤、伤口感染、皮肤湿疹。

6. 小琉球鳞花草（新拟） 小琉球鳞球花（台湾植物志）

Lepidagathis secunda (Blanco) Nees in DC. Prodr. 11: 259.1847; Hosok. (Takahide Hosokawa 细川隆英) in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. 22 (121): 227.1932; C. F. Hsieh et T. C. Huang in Taiwan 19 (1): 22.1974, et in Fl. Taiwan. 4: 651.1978 ed. 2. 4: 673.1998. — *Ruellia secunda* Blanco, Fl. Filip. 495.1837.

直立或铺散草本，茎4棱，光滑，叶卵形，卵状披针形，长1.5—2厘米，宽7—10毫米，顶端急尖，边缘具波状圆齿，基部圆，骤然变狭至柄，上面被微毛，粗糙，背面脉上有刚毛。穗状花序顶生，稀腋生，聚集，被短绢丝状刚毛，无腺毛的总苞，约长1厘米，能育苞片与小苞片同形，披针形，有短尖头；花萼5深裂，裂片急尖，无芒，钝，较大的披针形，草质，花冠长达6毫米，喉部内外有髯毛，冠檐裂片外面稍被微柔毛。雄蕊内藏，花药长1毫米，顶端有长柔毛，子房矩圆形；花柱疏被刚毛。花盘上位，草质。蒴果长4毫米，圆锥形。种子圆。

产我国台湾（屏东）。菲律宾（模式标本产地）也有分布。

作者仅在美国密苏里植物园标本馆见到 T. C. Wang & M. T. Kao 5220. 1969. 08. 29. 采自 South Peak, 兰屿标本。但《台湾植物志》中引为卵叶鳞球花 *Lepidagathis inaequalis* Clarke ex Elmer, 怀疑可能误定，或二者即系一种，暂记于此，待看到模式标本或更多台湾标本后，再定。

7. 柳叶鳞花草（新拟） 柳叶鳞球花（台湾植物志）

Lepidagathis stenophylla C. B. Clarke ex Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30 (1): 214.1911. (Mat. Fl. Form.); C. F. Hsieh & C. T. Huang in Taiwan 19 (1): 22.1974, et in Fl. Taiwan. 4: 651.1978 ed. 2. 4: 678. photo 346.1998.

半灌木状草本，高40厘米，茎直立，纤细，直的或“之”字形曲折，4棱，棱角