

尖锐，上部变狭近有翅，稍被微毛。叶极狭线形，长 7 厘米，宽 3 毫米，近无柄或具短柄，稍镰刀状下弯或近于直，顶端钝，基部逐渐变狭，渐狭的叶柄长 3 毫米，边缘波状，两面被极短的疏微毛，草质，侧脉开展，与中肋成 90 度，两面隆起，背面灰白色。穗状花序卵形或长卵形，顶生或腋生，长 13 毫米，苞片披针形，覆瓦状排列，很密，长 5 毫米，宽 1.5 毫米，顶端具芒，边缘有纤毛，背面有细瘦髯毛，具 1 脉，花无梗。花萼管状，外面有伏贴髯毛，里面光滑，长 6 毫米，5 浅裂，裂片具 1 脉，有芒，边缘有纤毛，后方的极宽披针形，两侧的极狭而极短，前方的最长；花冠管状钟形，几不超过花萼，管长 1.5 毫米，在喉部极收缩，近球形，光滑，冠檐钟形，外面有反折微毛，里面光滑，基部有髯毛，4 浅裂，冠檐裂片圆卵形，后方的一枚顶端 2 齿裂。雄蕊 4，着生于冠檐基部，花药室明显。子房卵形，被刚毛。花柱略被刚毛，柱头头状球形。花盘环状，稍 5 浅裂。

产台湾屏东。(模式标本产地)

亚族 2. 色萼花亚族 *Chroesthidinae* Bremek.

仅 1 属，花萼前裂片不联合，完全分离。蒴果压扁。种子被微毛。

42. 色萼花属 *Chroesthes* R. Ben.

R. Ben. in Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) **33**: 107. 1927; et in Lec.,
Fl. Gen. Ind.-China **4**: 684. 1935.

灌木。叶全缘，具柄，叶片椭圆状披针形至披针形，稍异型或近同型。花序有间隔，具短分枝的聚伞圆锥花序。苞片和小苞片绿色，常带蓝色。花萼不等裂，基部联合，后方 1 枚最大，前方 2 枚次之，两侧的 2 枚最狭。花冠 1/4—1/3 处圆柱形，上部斜漏斗形，冠檐裂片覆瓦状排裂，2 唇形，上唇较下唇浅裂。雄蕊 4，后方的较前方的稍短，彼此分离，着生于花冠管扩大处的基部。花药 2 室，药室平行，着生于不同水平，背部被微毛，基部均具长尖距。子房具 4 胚珠。花柱下部被微毛。蒴果盒形，子房室直达基部不收缩处。种子扁，全部被棕色微柔毛。

记录 3—4 种，实仅 1 种。分布于缅甸、泰国、中国西南部、中南半岛和马来半岛。我国有 1 种。

属名模式：*Chroestes pubiflora* R. Ben.

1. 色萼花 (中国高等植物图鉴) 图版 31: 13—18

Chroesthes lanceolata (T. Anders.) B. Hansen in Nord. Journ. Bot. **3**: 209. 1983. — *Asystasia lanceolata* T. Anders. in Journ. Linn. Soc. Bot. **9**: 524. 1867;