

En. FL. Pl. Nepal **3**: 143.1982; 云南种子植物名录 (下册): 1680.1984.——*Aeschynanthus dunnii* Lévl. in Fedde, Repert. **9**: 453.1911; Fl. Kouy-Tcheou. 180.1914; Rehd. in Jour. Arnold. Arb. **16**: 315.1935.——*Lonicera menelii* Lévl. Fl. Kouy-Tcheou: 63.1914; Rehd. l. c.

灌木或小乔木，高达5米，枝皮淡红色，剥落。叶椭圆状矩圆形至矩圆形，长(5—)8—18厘米，宽(1—)3.5—5厘米，顶端渐尖至长渐尖，边缘多少具浅波，具5—7对侧脉，草质，上面粗糙，背面沿脉被疏毛，短枝叶较小，下部叶早落。聚伞花序腋生，具1—4花，总花梗短，4棱形，约长8—16毫米，被短柔毛；花梗纤细，圆柱形，伸长，下部具2钻形小苞片，苞片微小，早落；花萼5裂，裂至近基部，裂片不等大，线状披针形，长7—8毫米，外面被微毛，里面具灰白色绒毛，中肋1条，明显；花冠橙黄色，长约18毫米，外有微毛；略成2唇形，花冠管长约13毫米，略弯，上唇2裂，下唇3深裂，外面密被微毛；雄蕊2，着生近花冠管基部，花丝舌状，光滑，长2.5厘米，伸出花冠之外很多，花药2室，长圆形，平行，纵裂，背着，花丝基部附近有2退化雄蕊的残迹。花柱细长，柱头外露。蒴果圆柱形，近棒状，钝，长而光滑，长2.5—3厘米，具8粒种子。

产云南(盈江、耿马、沧源、凤庆、景东、西双版纳、金平、元阳、西畴、麻栗坡)、贵州(罗甸)、广西(靖西、德保)。生于海拔900—1500米混交林下，灌丛中。印度东北部、锡金也有分布。

6. 金塔火焰花(新拟) 火焰花(海南植物志)

Phlogacanthus pyramidalis R. Ben. in H. Lec., Fl. Gen. Indo-Chine **4**: 711.1935; Merr. et Chun in Sunyatsenia **5**: 185.1940; 海南植物志 **3**: 554.1974.

粗壮草本，高约1米；嫩枝和花序轴近4棱，无毛。叶纸质，椭圆形或椭圆状卵形，长约23厘米，宽约8.5厘米，两端近急尖或顶端短渐尖，基部稍下延，全缘，两面无毛或背面脉上被紧贴微柔毛；中脉粗大，侧脉每边约8—10条；叶柄长约2.5厘米。花序总状，顶生，结果时长26厘米，被微柔毛，小聚伞花序有花3朵，总花梗长1—3毫米；苞片生于下部的3对叶状，长2—3厘米，上部的小，卵状或披针形，长5—6毫米；花梗长3—5毫米；小苞片长约1毫米；花萼基部5棱，深5裂，裂片线形，长约3.5毫米；花冠淡紫红色。蒴果棒状，有4钝棱，长2.2厘米，顶端钝；种子每室4粒，圆形呈两侧压扁状。花期4月。

产海南(保亭、万宁、兴隆)。生于低海拔至中海拔林中，罕见。越南北部也有分布。