

46. 十万错属 *Asystasia* Bl.

Blume, Bijdr. 796. Jul-Dec 1826; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit.

Ind. 4: 492. 1884.

草本或灌木，疏松，铺散，几具长匍匐茎。叶蓝色或变化于黄蓝色之间，全缘或稍有齿；花排列成顶生的总状花序，或圆锥花序，苞片和小苞片均小，萼5裂至基部；裂片相等；花冠通常钟状，近漏斗形，冠檐近于5等裂，上面的细长裂片略凹；雄蕊4，2强，内藏，基部成对连合，花药2室，药室平行，有胼胝体或附着物；花柱头状，两浅裂或两齿，胚珠每室2颗；蒴果长椭圆形，基部扁，变细，无种子，上部中央略凹四棱形，两室，有种子4粒。

70种，分布于东半球热带地区。我国有3种，产南部和西南部。

属名模式：*Asystasia intrusa* (Forsskal) Blume

分种检索标

1. 叶狭卵形或卵状披针形。

2. 叶较狭，狭卵形至卵状披针形，可达18厘米×4厘米，上面中脉有疏毛，背面主脉上糙硬毛……

…………… 1. 十万错 *A. chelonoides* Nees

2. 叶披针形，可达18厘米×2.8厘米，背面主脉被糙毛，上面有柔毛。……………

…………… 3. 囊管花 *A. salicifolia* Craib

1. 叶较宽，卵形，长卵形，可达14厘米×6厘米，叶具柄，上面中脉被柔毛，背面主脉上糙硬毛……

…………… 2. 宽叶十万错 *A. gangetica* (L.) T. Anders.

1. 十万错 (中国高等植物图鉴) 图版 33: 1—4

Aystasia chelonoides Nees in Wall Pl. As. Rar. 3: 89. 1832 et DC. Prodr. 11: 164. 1847; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 493. 1884; R. Ben. in Fl. Gen. Indo-Chine 4: 713. 1935; Bremek. in Dansk Botan. Arkiv. 21: 78. 1961; ibid 22 (2): 212. 1965. 中国高等植物图鉴 4: 169. 1975. — *A. violacea* Dalziel ex C. B. Clarke in Hook f. Brit. Ind. 4: 494. 1884; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. ser. 10: 199. 1912.

多年生草本，高达1米；茎两歧分枝，几被微柔毛；叶狭卵形或卵状披针形，长6—12 (—18) 厘米，顶端渐尖或长渐尖，基部急尖，具浅波状—圆齿，上面边缘被微柔毛或光滑，钟乳体白色，粗大，明显。花序总状，顶生和侧生，花单生或3出而偏向一侧，花梗长1—2毫米；苞片和小苞片微小，长2—3毫米；花萼裂片5，披针形，长5—6毫米，与苞片和小苞片均疏生柔毛和腺毛；花冠2唇形，白带红色或紫色，冠管