

Clarke ex C. Y. Wu, Index Fl. Yunnan. (云南种子植物名录下册): 1669.1984, nom. seminud.

草本, 高 60 厘米, 茎 4 棱, 具沟, 节膨大, 膝曲, 疏被微毛。叶同型, 具短柄至几无柄。叶对生, 叶片披针形, 长 13—16 厘米, 宽 1.8—2.8 厘米, 顶端长渐尖, 基部宽楔形, 下延, 全缘, 被短纤毛, 两面疏被微毛, 背面脉上较密, 叶柄密被多节长柔毛。花序顶生, 花对生于花序轴节上, 一侧发育, 一侧不育, 整个花序偏向一侧; 苞片和小苞片小, 约长 2 毫米; 花萼 5 裂至近基部, 裂片披针形, 边缘和中肋被毛, 长 8 毫米; 花冠长 2.5 厘米, 冠管 $1/3$ 处逐渐膨大, 冠檐 5 裂, 裂片长为花冠的 $1/3$ 。花柱细长, 柱头 2 裂。

产云南蒙自。泰国北部(模式标本产地 Doi Sutep)也有。

作者在哈佛大学阿诺德植物标本馆见到 B. Hanson 所鉴定的 *Asystasia salicifolia* Crais. 的标本和 A. Henry 13395 相近。

47. 白接骨属 *Asystasiella* Lindau

Lindau in Engler et Prantl, Nat. Pflanzamfam. 4. **3b**: 326.12 Mar.

1895; C. F. Hsieh & T. S. Huang Fl. Taiwan. **4**: 621.1978.

草本或灌木, 叶同型, 具柄, 对生。总状花序伸长或圆锥花序, 顶生; 苞片和小苞片小, 短于花萼; 花大, 无梗, 单生, 对生; 花萼 5 裂至基部, 裂片等大; 花冠管极狭长, 在喉部突然张开, 一面膨胀, 冠檐 5 裂, 裂片近相等, 开展, 芽时覆瓦状排列; 雄蕊 4, 着生于花冠喉部, 2 强, 内藏, 花丝基部成对连合, 花药矩圆形, 药室等高或稍不等高, 钝, 花粉有棘刺具多孔; 子房具 4 胚珠; 花柱头状。蒴果棍棒状, 基部收缩成实心柄状; 种子 4, 圆形, 偏, 瘤状凸起, 多皱纹。

约 3 种, 分布于旧大陆热带。

属名模式: *Asystasiella neesiana* (Wall.) Lindau

本属与十万错 *Asystasia* 的主要区别是, 冠管狭长, 花粉纹饰刺状。

1. 白接骨(中国高等植物图鉴) 尼氏拟马偕花(台湾植物志) 图版 34: 1—4

Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau in Engl. & Prantl. Nat. Pflanzem. 4. **3b**: 326.1895.——*Asystasia neesiana* (Wall.) Nees in Wall. Pl. As. Rar. **3**: 89.1832.et in DC. Prodr. **11**: 164.1847; R. Ben. in H. Lect. Fl. Gen. Indo-Chine **4**: 715 p. p. fig. 78.1935; C. F. Hsieh & T. C. Huang, Fl. Taiwan **4**: 621.1978; ib. 2 ed. **4**: 649.1998.——*Ruellia neesiana* Wall. Pl. As. Rar. **1**: 73, t. 83.1831.——*Asystasiella chinensis* (S. Moore) E. Hossain in Not. Bot. Gard. Edinb. **32** (3): 405. 1973; 中国高等植物图鉴 **4**: 169.1975; 云南种子植物名录(下册): 1669.1984.——*Asystasia*