

标本馆看到 Fung H. 20379 采自海南文昌和 Leu S. K. 2304 采自广东翁源各两张同号标本, 均被 B. Hansen 定为 *Leptostachya wallichii* Nees, 而 *Leptostachya wallichii* Nees (Cuming n. 548) 产菲律宾; *Justicia wallichii* T. Anders. (Wall. Cat. 2411) 产印度尼西亚吉里山区 (Nilgiri et Kurg); *Dianthera leptostachya* C. B. Clarke 产印度德干半岛山区; *Odontonemella leptostachya* (C. B. Clarke) Lindau 产印度、巴基斯坦、孟加拉国, 这些标本作者均未见过, 相信 B. Hansen 见过这些地区的模式材料, 作此判断, 故采用 B. Hansen 的较广概念; 广西凌云标本 (只见照片) 确有一些差异 (据罗献瑞、方鼎描述), 但这些可能属于形态的数量变化, 属于生态变异的范围, 暂予保留。该模式标本产地与百色极近, 但须见到标本, 再最后肯定是否只有一种。

2. 尾叶纤穗爵床 (广西植物)

Leptostachya caudatifolia H. S. Lo et D. Fang in *Guihaia* 17 (1): 45.1997.

草本, 高约 1 米, 除花序外无毛。叶纸质至厚纸质, 椭圆形, 长 3—10 厘米, 宽 1.2—4.2 厘米, 先端短尾尖状, 干时黄绿色, 侧脉每边 5—6 条。穗状花序腋生, 长 1—3 厘米, 间断, 轴被 2 列微毛; 苞片对生, 线状三角形, 基部有时叶状, 长 3—4 (10) 毫米, 革质, 一枚不孕; 萼 5 裂, 裂片狭三角形, 长 2.5 毫米; 花冠白色, 长 11 毫米, 外面疏被倒向短柔毛, 上唇长约 5 毫米, 下唇 3 浅裂, 裂片长约 2.5 毫米; 雄蕊 2。药室不等高, 基部无距; 花柱几无毛。

产广西凌云。生石灰岩山林下。(仅见模式标本照片)

51. 银脉爵床属 *Kudoacanthus* Hosok.

Hosok. in *Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan*. 23: 94.1933; C. F. Hsieh & T. C. Huang, in *Fl. Taiwan* 2nd ed. 4: 669. Pl. 306, photo 344.1998; T. S. Ying, Y. L. Zhang & D. Boufford, *The Endemia Gen. Seed Pl. China* (中国种子植物特有属): 64.f. 11. Map. 11.1993.

上升草本, 通常下部节上生根。叶小, 对生。花少, 生于顶生圆锥花序; 苞片线形, 小苞片 2; 花萼 5 深裂, 裂片线形; 花冠管短, 上部稍稍扩大, 冠檐 4 浅裂, 上裂片直立, 凹形, 顶端微凹, 下 3 裂片几相等, 开展; 雄蕊 2, 着生于花冠喉; 花药 2 室, 药室平行, 几相等, 基部无芒, 不育雄蕊无; 花盘不成环状; 子房 2 室, 每室 2 胚珠, 花柱线状, 柱头稍 2 裂。

台湾特有单种属。

1. 银脉爵床 (台湾植物志)

Kudoacanthus albo-nervosa Hosok. in *Trans. Nat. Hist. Soc. Form.* 23: 94.133; C.