

西、云南及西藏等地。

属名模式: *Isoglossa origanoides* (Nees) S. Moore (*Rhytiglossa ciliata* Nees)

分种检索表


1. 通常为多次 2 歧分叉的聚伞花序, 长达 5—10 厘米, 宽 3—8 厘米, 稀退化为总状
 1. 叉序草 *I. collina* (T. Anders.) B. Hansen
 1. 花序顶生, 由间断的聚伞花序组成的圆锥花序, 长达 10 厘米, 宽 2 厘米, 花序轴光滑无毛, 圆柱形 2. 光叉序草 *I. glabra* (Hand.-Mazz.) B. Hansen

1. 叉序草 (中国高等植物图鉴) 图版 36: 1—5

Isoglossa collina (T. Anders.) B. Hansen in Nord. Journ. Bot. **5** (1): 12. 1985; H. Chu in Bull. Bot. Res. **11** (1): 47. 1991. — *Justicia collina* T. Anders., in Journ. Linn. Soc. Bot. **9**: 515. 1867. — *Dianthera collina* (T. Anders) C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. **4**: 543. 1885. — *Dianthera sinensis* W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **12**: 204. 1920. — *Chingiacanthus patulus* Hand.-Mazz. in Sinenia **5**: 11. 1934; 中国高等植物图鉴 **4**: 178. 1975; H. W. Li in C. Y. Wu et al., Fl. Xizang **4**: 417. f. 181. 1—6. 1985. — *Andrographis ovata* auct. non Benth. 云南种子植物名录 (名录): 1669. 1984; List Pl. Xizang: 362. 1984.

草本, 茎高达 1 米。茎圆柱形, 茎基部匍匐并生根, 后直立, 纤细, 深绿色, 下部无毛, 向上被微柔毛。叶具柄, 叶片卵形至卵状椭圆形, 长 3.5—11 厘米, 宽 2—4.8 厘米, 顶端渐尖, 近全缘, 基部楔形, 上部叶的基部圆形, 侧脉 6—7 对; 叶柄长 1—3 厘米, 两面有褐棕色短柔毛。花序顶生或腋生上部叶腋。通常为多次 2 歧分叉的聚散花序, 长达 5—10 厘米, 宽 3—8 厘米, 稀退化为总状; 花序轴有腺毛或稀有无柄腺毛几无毛, 分枝稍扁平。苞片披针形, 无小苞片。花萼裂片 5, 狭披针形, 近钻形。长 4—7 毫米; 花冠粉红色或白色, 长 2—3 厘米, 花冠筒下部细长, 上部扩大成狭漏斗形, 外面光滑, 冠檐 2 唇形, 上唇微凹, 下唇 3 浅裂, 裂片长 3—6 毫米, 2 侧裂片较狭; 雄蕊 2, 着生于花冠筒扩大部的中上部, 花丝 4—10 毫米, 无毛, 2 药室, 长达 4.5 毫米, 等大, 平行, 稍分离, 在一半处叠生; 子房无毛, 下部为一杯状花盘所围, 具 4 粒胚珠, 花柱无毛。蒴果长 12—14 毫米, 下部实心而短柄, 上部具 4 粒种子。种子有粗糙不规则脊皱褶, 常有小而急尖的凸起。

产江西 (大余云峰山)、广东 (乳源、连县、英德、乐昌、翁源、怀集、阳山、仁化)、广西 (昭平、阳朔、桂林、修仁、大瑶山)、湖南 (宜章)、云南 (景东、勐腊、腾冲)、西藏 (墨脱)。生山坡阔叶林下或溪边阴湿地, 海拔 2200 米。不丹、锡金也有分布。



图版 36 1—5. 叉序草 *Isoglossa collina* (T. Anders.) B. Hansen; 1. 部分植株示花序, 2. 花冠剖面示雄蕊, 3. 雄蕊示药室和花丝, 4. 雌蕊, 5. 蒴果。(林 泉绘)