

山、深圳)、海南(保亭、三亚和澄迈)、广西(桂林、龙州)、香港、澳门、云南(易门、勐仑、小勐养)、贵州(黔南)、四川(峨眉、峨边)。生于海拔1800米以下疏林下、溪边、路旁。分布于孟加拉国、印度东北部、中南半岛。

可药用,清热解毒,生津利尿。

3. 优雅狗肝菜(中国高等植物图鉴) 金江狗肝菜(云南种子植物名录)

Dicliptera elegans W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **10**: 174.1918; Hand.-Mazt. Symb. Sin. **7**: 898 1936; 中国高等植物图鉴 **4**: 172.1975, in adnot.; 云南种子植物名录(下册): 1673.1984.

亚灌木,株高60—120厘米,茎直立,纤细,被短柔毛,具沟,沟内充满白色绒毛,叶片长7—8厘米,宽达4厘米,卵形或卵状披针形,顶端渐尖,基部宽楔形,下延或近圆形,全缘,膜质,上面绿色,疏被疏柔毛,脉上密被淡黄色疏柔毛,背面灰白色,到处散生疏柔毛。圆锥花序大;一级总花梗腋生枝上部,长达7厘米,被有易脱落的白色绒毛,总花梗顶部的苞片线状钻形,长达1厘米,常常被疏柔毛,二级总花梗3—6出,长5—10毫米,被白色绒毛或密被黄色疏柔毛,苞片不等,近圆形至倒卵形,长约1.5厘米,宽约1.3厘米,顶端有长的短尖头,基部圆,绿色,薄膜质,外面疏被毛和细平行纵向线条形钟乳体,里面具细平行线条,内有3—4朵花和小苞片着生,小苞片长5—7毫米,线状披针形,长渐尖,稍被微柔毛或疏柔毛。花萼长6—7毫米,裂片线状披针形,渐尖,被微柔毛。花冠约长1.8厘米,淡白色玫瑰红色,冠管纤细,外面多少被白色疏柔毛,冠檐深两唇形。雄蕊2,外露,花药2室,略不等高。子房稍被疏柔毛,花柱丝状。蒴果长6毫米,外面被淡黄色毛。种子圆盘形,极扁,淡黄色,薄膜质。

产云南(丽江)、四川(峨眉、峨边、木里、盐源)。生于海拔1500—2000米的密林边缘开阔处。模式标本采自云南丽江。

本种和*Dicliptera chinensis* Nees相近,其苞片几圆,总花梗和花梗被极密白色绒毛,易与其他种区别。

4. 毛狗肝菜(云南种子植物名录)

Dicliptera induta W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **10**: 175.1918; 云南种子植物名录(下册): 1673.1984.——*D. mairei* R. Ben., Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. **20** (ser.) **2**: 150.1930.

嫩枝密被淡黄色绒毛,后具刚毛。叶具约长1厘米的柄,柄上亦被黄绒毛或黄刚毛;叶片卵形,顶端多少急尖,基部宽楔形或近圆形,全缘,膜质,长3—4厘米,宽1.5—2.5厘米,两面中脉和侧脉密被黄色长柔毛,其余被疏柔毛。花序聚伞状,具短总花梗的聚伞花序腋生,一级和二级总花梗极短,仅2—3毫米,梗上面密被黄色刚毛;下面的苞片约长5毫米,线状钻形,被疏柔毛;花苞片不等大,倒披针形,长1—1.4