

生短柔毛，2唇形，下唇3裂；雄蕊2，花丝细长，伸出，花药被长硬毛，2室叠生，一上一下，线形纵裂。蒴果长1—1.2厘米，疏生短柔毛，开裂时胎座不弹起，上部具4粒种子，下部实心；种子有小疣状突起。

产自河南（伏牛山）、安徽（巢县、歙县、黄山、潜山）、江苏（苏州、无锡、常熟、虞山）、浙江（杭州、绍兴、宁波、天目山、四明山、寿山）、江西（大余云峰山、九江庐山、南丰、瑞金、贵溪、资溪、崇仁、虞南）、福建（崇安、浦城、南平、闽侯）、湖北（利川、长阳、来凤）、广东（怀集、乐昌、乳源、和平、始兴、连平）、广西（凌云、龙胜、三江、全县、桂林）、湖南（永顺、安江、长沙岳麓山、保靖）、重庆（南川）、贵州（毕节、遵义、习水）、云南（红河、文山）。低海拔广布，生路边，草地或林下。日本也有。

药用能解表发汗等。

7. 五指山蓝（海南植物志）

Peristrophe lanceolaria (Roxb.) Nees in Wall. Pl. As. Rar. **3**: 114.1832. C. B. Clarke in Fl. Brit. Ind. **4**: 555.1885; R. Ben. in H. Lec. Fl. Gen. Indo-Chine **4**: 768.1935; Bremek. in Dansk Bot. Ark. **20**, 1: 81.1961. 海南植物志 **3**: 561.1974. — *Justicia lanceolata* Roxb. Fl. Ind. **1**: 122.1820. — *Clinacanthus nutans* sensu Groff. Ding et Groff in Lingn. Agr. Rev. **3**: 22, 1925. non (Burm. f.) Lindau. 1895.

直立草本，高30—50厘米；枝稍粗壮，无毛，节上缢陷明显。叶披针形或卵状披针形，顶端呈弯弓的尾状渐尖，基部稍偏斜，狭楔形，全缘，长6—12厘米，宽1—4厘米，纸质，通常仅中脉上被柔毛，钟乳体针状，不甚明显，干时上面有时具颗粒状隆起；中脉稍阔，干时背面平扁，侧脉每边6—7条，两面稍隆起；叶柄长1.5—3厘米。头状花序被腺毛，常2或3个聚于顶生或腋生的总花梗上，总苞片2枚，剑形或线状披针形，比萼齿长一倍以上，长10—14毫米，宽1.5—3毫米；萼长约5毫米，裂片长4毫米；花冠淡红色，长约4.3厘米，被柔毛，冠管狭长，为花冠之半，唇片为1/2。雄蕊2，外露，药室矩圆形，一上一下，分离。柱头稍膨大。蒴果长1.4厘米，被柔毛。花期10月。

产海南（琼中五指山）、云南（景洪、勐腊）。生阴湿处，海拔600米。缅甸和泰国、老挝也有分布。

8. 岩观音草（新拟） 岩山蓝（海南植物志）

Peristrophe montana Nees in Wall., Pl. As. Rar. **3**: 113.1832. et in DC. Prodr. **11**: 493.1847. p. p.; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 556.1885; Hemsl in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 248.1890; 海南植物志 **3**: 561.1974.

直立，无毛草本，高约1米。叶狭长圆形或披针形，稀近卵形，顶端长渐尖，基部急尖，稀渐尖，全缘，长4—9（—20）厘米，宽3—5厘米，薄纸质或近膜质，上面常