

淡紫色，长约2厘米，外面喉部和下唇被短硬毛。冠檐2唇形，喉部稍扭转，上唇长圆状椭圆形，长约1厘米，顶端钝圆，齿状2裂，下唇长圆状匙形，3浅裂；雄蕊2，生喉部，花丝长7.5—8厘米，被硬毛，花药2室，药室线形，一上一下，无距。蒴果（未充分成熟）长8—9毫米。被硬毛；种子每室2粒。

产浙江（天目山）。

11. 滇观音草（云南种子植物名录）

Peristrophe yunnanensis W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **10**: 187:1918; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 897.1936; 云南种子植物名录（下册）: 1680.1984.

草本，高1—2米。茎具沟，纤细，略呈“之”字形曲折，光滑，近禾秆色，节上膝曲膨大，幼枝被极小稍灰白色微毛。叶（仅看到上部的）披针形或卵形，叶柄长1—3毫米，极小被微毛，顶端长渐尖，基部大多楔形，全缘，长2.5—3厘米，宽约1厘米，干时软膜质，上面稀疏被微毛（在脉上密），最后光滑，背面脉上初密被微毛。由聚伞花序组成松散大型的圆锥花序，聚伞花序最外的苞片长3毫米，线形，着生于基部；花苞片大多4枚，线状披针形，急尖，长6—7毫米，外面密被灰白色微毛，边缘多少为干膜质；小苞片2，与苞片相似，长5—6毫米；花在苞片组成头状花序内通常单生。花萼长5—6毫米，裂片5，线形，急尖，几裂至基部，光滑或近光滑。花冠约长1.8厘米，玫瑰红色至淡蓝色，稍带灰色，外面稍被微毛。雄蕊2，花丝上部光滑，下部被微毛，花药外弯，花药矩圆形，平行，下部叉开，背着。花柱纤细。成熟种子未见。

产云南〔漾濞（模式标本产地）、大理、鹤庆、大姚牛街、华坪新庄、禄劝〕、四川（米易、西昌芦山）。

本种与 *Peristrophe speciosa* Nees 相近，其苞片非常不同，花在同属中小一半，苞片属 *Peristrophe bicalyculata* 种类型。

55. 枪刀药属 *Hypoestes* Soland. ex R. Br.

Soland. ex R. Br., Prodr. **1**: 474.1810.

灌木或草本。叶全缘或有齿。穗状花序腋生、由数个或多个头状花序组成、头状花序常无总花梗；总苞片4或2枚，合生成圆筒形或分离，内有3至数朵花，通常仅1朵发育，其余的退化，常有残存的花萼和小苞片，小苞狭小；花萼小、藏于总苞内，5裂，裂片等大，通常线形或线状披针形；花冠粉红色或白色，冠管细长，扭转，喉部稍扩大，直或顶部反折，冠檐2唇形，上唇直立，全缘或浅2裂，下唇阔，伸展或外弯，浅3裂，或裂至中部，裂片覆瓦状排列；雄蕊2枚，着生于花冠喉部，通常较冠檐短，花药1室，背着，无附属物；花盘杯状，子房每室有胚珠2粒、花柱丝状，柱头全缘或