

中，低海拔处。菲律宾群岛也有分布。

全草入药，有消炎散淤、止血止咳之效，可治肺结核咳血、支气管炎、糖尿病，外敷治跌打损伤。

2. 三花枪刀药 (中国高等植物图鉴)

Hypoestes triflora Roem. et Schult. Syst. 1: 88.1817; Nees in DC. Prodr. 11: 506.1847; T. Anders in Journ. Linn. Soc. Bot. 9: 522.1867; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 557.1865; 中国高等植物图鉴 4: 173.1975; 植物研究 1 (4): 108.1981; 西藏植物志 4: 417.1985.——*Dicliptera riparia* Nees var. *yunnanensis* Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 898.1936.

多年生草本，高达1.5米。茎多分枝，有关节，节间通长伸长。叶卵形状椭圆形至椭圆状矩圆形，顶端渐尖，边缘具极浅的钝齿，长3—10厘米，宽1.5—5厘米，两面疏生短柔毛。花序由1—5聚伞花序集成，交互生枝顶或上部叶腋，聚伞花序近无梗，苞片不等，外方2枚相联成总苞状，倒披针状矩圆形至倒卵状矩圆形，基部楔形，顶端绿色而带肉质，有短柔毛，其余4—6枚仅基部相联，较小，线状-披针形，急尖，干膜质而非绿色；花萼裂片4，条状披针形，长约5毫米；花冠长约1.5厘米，外生短柔毛，2唇形，下唇微3裂；雄蕊2，花药1室。蒴果长约9毫米，上部具4粒种子，下部实心；种子有小疣状凸起。

产云南（昆明西山、嵩明、富民、鹤庆、丽江、漾濞、腾冲、福贡、景东、勐海、勐连、蒙自）。生于海拔300—2100米路边或林下。温带喜马拉雅（尼泊尔、锡金、不丹）也有分布。据C. B. Clarke亦产非洲东北部的埃塞俄比亚。

3. 枪刀菜 (台湾植物志)

Hypoestes cumingiana Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 1122.1873; in nota sub *Peristrophe*; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 249.1890; Matsum. & Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo. 22: 296.1906; C. F. Hsieh & T. C. Huang in Taiwan 19 (1): 21.1974; in Fl. Taiwan 4: 642, pl. 1139.1978; ed. 2. 4: 661, pl. 303.1998.——*Peristrophe cummingiana* Nees in DC. Prodr. 11: 498.1847; Vidal Pl. Vasc. Filip.: 207. (= F.-Villar Noviss. App. Fl. Philipp.: 157.1880.)

灌木状草本，高达1米；茎上升或外倾，近圆柱形，上部稍被微毛。叶卵状长圆形，或线状披针形，长4—14厘米，宽2—4厘米，顶端渐尖或急尖，基部钝或具圆齿，边缘稍波状，两面光滑；叶柄长达2厘米。圆锥花序顶生或腋生，疏松，长达40厘米，花枝上叶片常较小。花1—2朵聚生于枝顶，苞片线状披针形，约长4.5毫米；花萼深5裂，裂片线形，被微柔毛和腺毛；花冠红色-紫色，长达2厘米，外面被微柔毛，冠檐2唇形，上唇椭圆形，约长8毫米，宽7毫米，顶端圆，下唇矩圆状椭圆形，约长12毫米，宽5毫米，浅3裂；雄蕊伸出花冠外，长8毫米；花柱长2厘米，稍粗糙，柱

头短2浅裂。蒴果矩圆状卵形，约长1.3厘米，密被微柔毛；种子4粒或更少，椭圆形，有疣状凸起。

产台湾（屏东、高雄、台东）海岸。菲律宾为模式标本产地。

56. 鳄嘴花属 *Clinacanthus* Nees

Nees in DC. Prodr. 11: 511.1847.

高大草本。叶全缘或具齿。花大而美丽、具短花梗、组成顶生、俯垂的聚伞花序紧缩成头状生于枝顶；苞片小、线形或披针形；花萼深5裂、裂片线状披针形、近等大；花冠管稍狭、基部内弯、喉部渐扩大、冠檐2唇形、上唇直立、狭窄、2浅裂、下唇稍伸展、3裂、檐片覆瓦状排列；雄蕊2枚、着生于花冠喉部、与冠檐近等长或稍短、花药1室、狭长圆形、基部圆、无附属物；花盘环状；子房每室有胚珠2粒、花柱细线状、柱头截平或不明显的2裂。蒴果棒状；种子每室2粒，有珠柄钩承托。

2种。1种广布于华南热带至马六甲、爪哇、加里曼丹等地；另1种分布于老挝。

属名模式：*Clinacanthus nutans* (Burm. f.) Lindau = *Clinacanthus burmanni* Nees nom. illeg.

1. 鳄嘴花（海南植物志） 扭序花（中国高等植物图鉴） 图版38: 7—10

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau in Engler et Prantl, Pflanzenfam. 4. 3b: 340.1895; 海南植物志 3: 565.1974. 中国高等植物图鉴 4: 171.1975. — *Justicia nutans* Burm. f. Fl. Ind. 10. t. 5. f. 1.1768. — *Clinacanthus burmanni* Nees in DC. Prodr. 11: 511.1847; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 524.1884; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 244.1890; Ridl. Pl. Malay. Penins. 2: 592.1923; R. Ben. in H. Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 763.1935. nov. illeg.

1a. 鳄嘴花（原变种）

var. ***nutans***

高大草本、直立或有时攀援状。茎圆柱状、干时黄色、有细密的纵条纹、近无毛。叶纸质、披针形或卵状披针形，长5—11厘米，宽1—4厘米，顶端弯尾状渐尖，基部稍偏斜，近全缘，两面无毛；侧脉每边5或6条，干时两面稍凸起；叶柄长5—7毫米或过之。花序长1.5厘米，被腺毛；苞片线形，长约8毫米，顶端急尖；萼裂片长约8毫米，渐尖；花冠深红色，长约4厘米，被柔毛。雄蕊和雌蕊光滑无毛。蒴果未见。

花期：春夏。

广布于华南热带至中南半岛、马来半岛、爪哇、加里曼丹。产我国云南（景洪）、广西（龙州）、广东（广州、鼎湖）、海南（文昌、海口、儋州、白沙、三亚）等地。生于低海拔疏林中或灌丛内。