

头短2浅裂。蒴果矩圆状卵形，约长1.3厘米，密被微柔毛；种子4粒或更少，椭圆形，有疣状凸起。

产台湾（屏东、高雄、台东）海岸。菲律宾为模式标本产地。

56. 鳄嘴花属 *Clinacanthus* Nees

Nees in DC. Prodr. 11: 511.1847.

高大草本。叶全缘或具齿。花大而美丽、具短花梗、组成顶生、俯垂的聚伞花序紧缩成头状生于枝顶；苞片小、线形或披针形；花萼深5裂、裂片线状披针形、近等大；花冠管稍狭、基部内弯、喉部渐扩大、冠檐2唇形、上唇直立、狭窄、2浅裂、下唇稍伸展、3裂、檐片覆瓦状排列；雄蕊2枚、着生于花冠喉部、与冠檐近等长或稍短、花药1室、狭长圆形、基部圆、无附属物；花盘环状；子房每室有胚珠2粒、花柱细线状、柱头截平或不明显的2裂。蒴果棒状；种子每室2粒，有珠柄钩承托。

2种。1种广布于华南热带至马六甲、爪哇、加里曼丹等地；另1种分布于老挝。

属名模式：*Clinacanthus nutans* (Burm. f.) Lindau = *Clinacanthus burmanni* Nees nom. illeg.

1. 鳄嘴花（海南植物志） 扭序花（中国高等植物图鉴） 图版38: 7—10

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau in Engler et Prantl, Pflanzenfam. 4. 3b: 340.1895; 海南植物志 3: 565.1974. 中国高等植物图鉴 4: 171.1975. — *Justicia nutans* Burm. f. Fl. Ind. 10. t. 5. f. 1.1768. — *Clinacanthus burmanni* Nees in DC. Prodr. 11: 511.1847; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 524.1884; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 244.1890; Ridl. Pl. Malay. Penins. 2: 592.1923; R. Ben. in H. Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 763.1935. nov. illeg.

1a. 鳄嘴花（原变种）

var. ***nutans***

高大草本、直立或有时攀援状。茎圆柱状、干时黄色、有细密的纵条纹、近无毛。叶纸质、披针形或卵状披针形，长5—11厘米，宽1—4厘米，顶端弯尾状渐尖，基部稍偏斜，近全缘，两面无毛；侧脉每边5或6条，干时两面稍凸起；叶柄长5—7毫米或过之。花序长1.5厘米，被腺毛；苞片线形，长约8毫米，顶端急尖；萼裂片长约8毫米，渐尖；花冠深红色，长约4厘米，被柔毛。雄蕊和雌蕊光滑无毛。蒴果未见。

花期：春夏。

广布于华南热带至中南半岛、马来半岛、爪哇、加里曼丹。产我国云南（景洪）、广西（龙州）、广东（广州、鼎湖）、海南（文昌、海口、儋州、白沙、三亚）等地。生于低海拔疏林中或灌丛内。



图版 38 1—6. 枪刀药 *Hypoestes purpurea* (L.) R. Br.: 1. 部分植株, 2. 花, 3. 花冠剖面示雄蕊, 4. 花萼裂片, 5. 总苞状苞片及内苞片, 6. 花粉粒。7—10. 鳄嘴花 *Clinacanthus nutans* (Burn. f.) Lindau: 7. 部分植株, 8. 花冠剖面示雄蕊, 9. 花萼裂片与苞片, 10. 雄蕊示单药室与花丝。(余汉平、李爱莉绘)