

全株入药，有调经、消肿、去瘀、止痛、接骨之效，可治跌打、贫血、黄疸、风湿等。

1b. 大花鳄嘴花 (变种)

var. **robinsoni** R. Ben. in Notul. Syst. 1935. et in H. Lec. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 764. 1935.

本变种与正种的区别在于：花较大，长达 6 厘米，体型也比较粗壮。

据 R. Ben. 在 (H. Lecomte Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 764. 1935.) 载：分布于马六甲、爪哇、加里曼丹以及我国海南。但未见这种类型的标本。

57. 针子草属 *Rhaphidospora* Nees

Nees in Wall., Pl. As. Rar. **3**: 77, 115, 15 Aug. 1832, et DC. Prodr. **11**: 464 et 499, 1847; Bremek. Verh. Ned. Akad. Wet. Nat. Sect. 2, **45** (2): 45. 1948.

攀援灌木或强壮的草本，疏松，分散。茎和分枝具关节，近圆柱形。叶对生，基部宽，在柄处收缩，两面具小细线条钟乳体，全缘或有锯齿。3 歧聚伞花序组成圆锥花序开展。腋生或有时顶生，花序轴节上一级分枝不等长，呈假两歧分枝状。两侧不育常成单生；苞片和小苞片小而狭，刚毛状。花萼短小，5 深裂，裂片不等，钻形。花冠小或中等，白色或淡色，边上有红点，冠管通常扭弯，冠檐 2 唇形，冠管圆柱形，在喉部扩大漏斗形，上唇凹而直立，顶端微缺，生多皱纹，下唇 3 裂至中部或基部，弯曲。雄蕊 2，外伸或内藏；花丝线形或阔而扁，多少被毛，花药室一上一下，上面的一枚较短，下面的一枚有距，有时被髯毛，花粉粒桶状，3 孔，通常孔两侧有纵长裂缝区，裂缝区内有矩圆形盾块对生。不育雄蕊无。子房每室有 2 胚珠，花柱细长。柱头 2 裂。蒴果基部变狭，顶端具 4 种子；隔壁全。种子圆形，由珠柄钩支撑，被刚毛。

约 12 种。分布于喜马拉雅、印度东部、斯里兰卡、中南半岛、印度尼西亚（爪哇）、菲律宾群岛、毛里求斯和马达加斯加。我国 1 种，产云南。

属名模式：*Rhaphidospora glabra* (Koenig ex Roxburgh) Nees

1. 针子草 (中国高等植物图鉴) 图版 39: 1—4

Rhaphidospora vagabunda (R. Ben) C. Y. Wu ex Y. C. Tang, 中国高等植物图鉴 **4**: 173. 图 5760 et 916 (index) 1975. comb. subnuda; 云南种子植物名录 (下册): 1683. 1984. —— *Justicia vagabunda* R. Ben. in Not. Syst. **4**: 114. 1936. latine et in H. Lec. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 734. 1935.

攀援状灌木。茎圆柱形，无棱条，略“之”字形曲折，光滑无毛。叶矩圆状披针形、顶端渐尖、通长镰状弯曲，基部两侧略不等、全缘或略波状，长 6—14 厘米，宽