

stolonifera C. B. Clarke 在某些方面与本种颇有相似之处,但那种(据原记载)不仅有真正的花序,且花冠管的长度为冠檐的2倍(8.4毫米/4.2毫米),小苞片为长圆形,区别也清楚。

2. 囊孩儿草(广西植物)

Rungia bisaccata D. Fang et H. S. Lo, in *Guihaia* **17** (1): 48. 1997.

草本,高过25厘米。叶卵状椭圆形,长5—13厘米,宽2.3—5.7厘米,侧脉每边5—7条。穗状花序枝生于顶叶腋,偏向一侧;苞片4列,能育与不能育均为倒卵形,长7—11毫米,宽4—8毫米,顶端圆,疏被小缘毛;小苞片长圆状椭圆形,长约10毫米;萼裂片长约7毫米;花冠白带红色,长18毫米,两面稍有腺状微毛,管内有个乳头状小囊,上唇长5毫米,下唇3浅裂,中裂片较宽;雄蕊2,下方一枚药室有距。子房和花柱无毛。

产广西(宁明,模式标本产地)。生于低海拔石灰岩山。

本种与密孩儿草 *Rungia densiflora* H. S. Lo 的区别:那种苞片全能育,宽1.5—3毫米,具3脉,小苞片倒卵形,长约6毫米,花萼长约4毫米,花冠天蓝色,仅下唇中裂片外面被须毛,其余无毛,管内无囊突。

3. 中华孩儿草(中国高等植物图鉴) 明萼草(台湾植物志) 图版40: 1—6


Rungia chinensis Benth. Fl. Hongkong: 266. 1861; Hayata, Icon. Pl. Form. **9**: 85. 1920; Yamamoto, Suppl. Icon. Pl. Form. **2**: 37. 1926, et in Journ. Trop. Agr. **7**: 142. 1935; C. F. Hsieh et T. C. Huang in *Taiwania* **19** (1): 22. 1974, et in Fl. Taiwan. **4**: 658. pl. 1145. 1978; ed. 2. **4**: 676. Pl. 309. 1998. 中国高等植物图鉴 **4**: 176. 1975.

草本,基部匍匐,高达70厘米。茎纤细,4棱,具沟槽。叶具柄,柄长5—15毫米,叶片卵形,椭圆形至椭圆状矩圆形,长2.5—9厘米,宽1.8—3厘米,顶端尖至近渐尖,基部宽楔形,侧脉每边5—6条。穗状花序较疏松,长1—3(—7)厘米,宽约1.5厘米,顶生或生上部叶腋,具总花梗,长1—2厘米,小穗在花序轴上互生,密集;苞片椭圆形至匙形,长7—8毫米,疏生短柔毛,覆瓦状排列;小苞片2,椭圆形,长约5毫米,具膜质边缘和睫毛;花萼裂片5,条状披针形,长3—4毫米;花冠淡紫蓝色,长约1.5厘米,2唇形,上唇三角形,下唇3裂,外面被白色柔毛;雄蕊2,药室不等高,下方1室具小矩。蒴果长约6毫米,开裂时胎座由蒴底弹起,种子4粒。

产安徽(祁门)、浙江(龙泉、昌化)、江西(石城、宁都、修水、黎川)、福建(长汀、建宁)、台湾(花莲、屏东、台东、南投、嘉义)、香港、广东(鼎湖、广州、连山)、广西(靖西、金秀)。生路旁和溪边。模式标本采自香港。

4. 密孩儿草(植物分类学报)

Rungia densiflora H. S. Lo in *Acta Phytotax. Sin.* **16** (4): 94. 1978; 浙江植物志



图版 40 1—6. 中华孩儿草 *Rungia chinensis* Benth.: 1. 植株, 2、3. 苞片及小苞片, 4. 花, 5. 雄蕊, 6. 开裂蒴果。(林 泉绘)