

stolonifera C. B. Clarke 在某些方面与本种颇有相似之处,但那种(据原记载)不仅有真正的花序,且花冠管的长度为冠檐的2倍(8.4毫米/4.2毫米),小苞片为长圆形,区别也清楚。

2. 囊孩儿草(广西植物)

Rungia bisaccata D. Fang et H. S. Lo, in *Guihaia* **17** (1): 48. 1997.

草本,高过25厘米。叶卵状椭圆形,长5—13厘米,宽2.3—5.7厘米,侧脉每边5—7条。穗状花序枝生于顶叶腋,偏向一侧;苞片4列,能育与不能育均为倒卵形,长7—11毫米,宽4—8毫米,顶端圆,疏被小缘毛;小苞片长圆状椭圆形,长约10毫米;萼裂片长约7毫米;花冠白带红色,长18毫米,两面稍有腺状微毛,管内有个乳头状小囊,上唇长5毫米,下唇3浅裂,中裂片较宽;雄蕊2,下方一枚药室有距。子房和花柱无毛。

产广西(宁明,模式标本产地)。生于低海拔石灰岩山。

本种与密孩儿草 *Rungia densiflora* H. S. Lo 的区别:那种苞片全能育,宽1.5—3毫米,具3脉,小苞片倒卵形,长约6毫米,花萼长约4毫米,花冠天蓝色,仅下唇中裂片外面被须毛,其余无毛,管内无囊突。

3. 中华孩儿草(中国高等植物图鉴) 明萼草(台湾植物志) 图版40: 1—6

Rungia chinensis Benth. Fl. Hongkong: 266. 1861; Hayata, Icon. Pl. Form. **9**: 85. 1920; Yamamoto, Suppl. Icon. Pl. Form. **2**: 37. 1926, et in Journ. Trop. Agr. **7**: 142. 1935; C. F. Hsieh et T. C. Huang in *Taiwania* **19** (1): 22. 1974, et in Fl. Taiwan. **4**: 658. pl. 1145. 1978; ed. 2. **4**: 676. Pl. 309. 1998. 中国高等植物图鉴 **4**: 176. 1975.

草本,基部匍匐,高达70厘米。茎纤细,4棱,具沟槽。叶具柄,柄长5—15毫米,叶片卵形,椭圆形至椭圆状矩圆形,长2.5—9厘米,宽1.8—3厘米,顶端尖至近渐尖,基部宽楔形,侧脉每边5—6条。穗状花序较疏松,长1—3(—7)厘米,宽约1.5厘米,顶生或生上部叶腋,具总花梗,长1—2厘米,小穗在花序轴上互生,密集;苞片椭圆形至匙形,长7—8毫米,疏生短柔毛,覆瓦状排列;小苞片2,椭圆形,长约5毫米,具膜质边缘和睫毛;花萼裂片5,条状披针形,长3—4毫米;花冠淡紫蓝色,长约1.5厘米,2唇形,上唇三角形,下唇3裂,外面被白色柔毛;雄蕊2,药室不等高,下方1室具小矩。蒴果长约6毫米,开裂时胎座由蒴底弹起,种子4粒。

产安徽(祁门)、浙江(龙泉、昌化)、江西(石城、宁都、修水、黎川)、福建(长汀、建宁)、台湾(花莲、屏东、台东、南投、嘉义)、香港、广东(鼎湖、广州、连山)、广西(靖西、金秀)。生路旁和溪边。模式标本采自香港。

4. 密孩儿草(植物分类学报)

Rungia densiflora H. S. Lo in *Acta Phytotax. Sin.* **16** (4): 94. 1978; 浙江植物志

6: 82.f. 6—105.1993.

草本，茎稍粗壮，被2列倒生柔毛，节间长3—7厘米；小枝被白色皱曲柔毛。叶纸质，椭圆状卵形，卵形披针状卵形，长2—8.5厘米，宽1—3厘米，顶端渐尖，稍钝头，基部楔形或稍下沿，两面无毛或疏生短硬毛，侧脉6—8对，明显，在背面平扁；叶柄长0.5—2厘米，被柔毛。穗状花序顶生和腋生，长达3厘米，密花，总梗短；苞片4列，全都能育（有花），同形，通常匙形或有时倒卵形，长7—11毫米，宽1.5—3毫米，顶端圆或钝，3脉，无干膜质边檐，缘毛硬，上部稍密；小苞片2，倒卵形，长约6毫米，宽约2—3毫米，有干膜质边檐和缘毛；萼长约4毫米，深5裂，几达基部，裂片线状披针形；花冠天蓝色，长11—17毫米，冠管长6—9毫米，上唇直立，长三角形，长5—8毫米，顶端2短裂，下唇长圆形，长5—8毫米，顶端3裂，中裂较小，外面被毛；雄蕊2，花丝长5—7毫米，无毛，下方药室有白色的矩。蒴果长约6毫米。

产广东（连平，模式标本产地）、江西（新建、石城、宁都、修水）、安徽（旌德、祁门）、浙江（杭州、临安、诸暨、宁波、开化、衢州、遂昌、松阳、龙泉、缙云、温州、瑞安）。生于海拔400—800米潮湿的沟谷林下。

本种的花序和 *R. stolonifera* C. B. Clarke 类同，主要区别在于那种有平铺的习性；苞片卵形，长约4.2毫米，宽约0.2毫米，干膜质边檐很明显；小苞片与苞片近等长；蒴果小，长仅3—4毫米，此外它的分布地区在缅甸和我国云南省的南部。

台湾孩儿草 *R. taiwanensis* Yamazaki 的苞片顶端芒尖，叶缘有波状牙齿，和本种的区别是清楚的。

5. 广西孩儿草（广西植物）

Rungia guangxiensis H. S. Lo et D. Fang in *Guihaia* 17 (1): 46.1997.

草本，高约70厘米，枝暗紫色。叶椭圆形或近卵形，长9—17厘米，全缘，背面被微毛，侧脉每边7条。穗状花序在侧枝上顶生；苞片4列，能育苞片近长圆形，长7—8毫米，顶端圆，无毛；花萼长约2.5毫米；花冠红色，长17毫米，外面无毛，上唇顶端钝，下唇3浅裂；雄蕊2，下方一枚药室有距。

产广西（防城，模式标本产地）。生于近海滨密林中。

据原文献载：“本种近 *Rungia naoensis* B. Hansen，后者能育苞片近圆形，连同花萼被短柄的腺体，不育苞片卵形；花萼长5—6毫米，花冠白色，长13毫米，外面被短柔毛。”

6. 金沙鼠尾黄（云南种子植物名录） 小苞孩儿草（植物分类学报）

Rungia hirpex R. Ben. in *Bull. Mus. Par.* 2 ser 2: 149.1930; *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* 7: 898.1936; 云南种子植物名录（下册）: 1684.1984.

草本，散生，茎相对节间有2列簇生的微毛，其余光滑。叶具柄，卵形或矩圆形，向基部急尖并在叶柄处下延，顶端渐尖，叶长2.5—9厘米，宽1.5—4.5厘米，稀在叶