

脉被毛，和边缘有毛。穗状花序顶生于茎和枝顶。苞片对生，4列，一对不育，另一对能育，披针状线形，钝，边檐狭，粗糙和有缘毛，苞片长10—14毫米，宽2—2.5毫米；小苞片矩圆状披针形，长6毫米，宽2毫米，几透明，边缘有缘毛。花萼线形，急尖，光滑，几裂至基部，裂片长5毫米；花冠长14毫米，冠管圆柱形，下唇3裂，上唇三角形，顶端近截形。雄蕊2，着生在喉部，花药下方一室基部有短距。子房光滑。蒴果长7—8毫米。光滑。（未见模式标本）

产云南（大关、盐津）。生于海拔500—600米处。模式标本采自云南盐津老鸦滩。

7. 长柄孩儿草（广西植物）

Rungia longipes D. Fang et H. S. Lo in *Guihaia* **17** (1): 49. 1997.

草本。高约0.5米。叶薄纸质至纸质，卵形或椭圆形，长约10.5—17厘米，宽4—8.5厘米，边有波状浅齿，背面脉上被短柔毛，侧脉每边6—7条；叶柄长（1—）4—4.5厘米，被柔毛。穗状花序腋生，长2.5—11厘米，偏向一侧；苞片4列，不育苞片（无花）椭圆形至倒卵状椭圆形，长（6—）10—12厘米，能育苞片（有花）倒卵状椭圆形，长约12毫米，均疏被几不明显的小缘毛；小苞片和能育苞片同形；宿存的花萼裂片钻状，长6—9毫米，花冠未见。未成熟蒴果长约10毫米，外被短柔毛。（仅见模式标本照片）

产广西（龙州）。生于沟谷林中。模式标本采自广西龙州大青山。

8. 矮孩儿草（植物分类学报）

Rungia mina H. S. Lo, in *Acta Phytotax. Sinica* **16** (4): 93. 1978; C. Y. Wu et al. 云南种子植物名录（下册）：1684. 1984.

矮小草本，高6—10厘米；茎细瘦，基部直径约1毫米，不分枝或有矮小分枝，被倒生白色腺毛状柔毛，上部很密。叶卵形或阔卵形，长0.5—2厘米，宽0.4—1厘米，顶端钝，基部阔楔形，全缘，二面疏生柔毛，边缘少粗糙；侧脉每边2—3条；叶柄长2—5毫米，密被柔毛。穗状花序顶生和腋生，紧密，球状或卵状，长5—10毫米，无总花梗；苞片全部有花，倒卵形或匙状倒卵形，长3.8—4毫米，顶端钝圆，有时具硬尖，边檐干膜质，小苞片2，干膜质，深凹，呈舟状，长约3毫米，边缘均被多节的长毛；萼5深裂，裂片线状披针形，长1.5—1.7毫米，渐尖；花冠紫色，平展时长约3.8毫米，冠管长1毫米，上唇直立，阔三角形，长约1.5毫米，下唇阔大，伸展，长约1.8毫米，裂片3，近圆形，径0.5毫米，中裂片外面被疏毛；花丝长约1.5毫米，药室卵形，下方一室有白色的距。蒴果长2.7毫米，有喙，且常有宿存花柱，无毛。

产云南（思茅、景洪）。生于海拔1400米疏林下湿润处。模式标本采自云南思茅。

本种易与孩儿草 *Rungia pectinata* (L.) Nees 混淆，但二者有极不相同的花序。孩儿草的4列苞片中有2列无花，花序偏向一侧。