

9. 那坡孩儿草 (广西植物)

Rungia napoensis D. Fang et H. S. Lo, in *Guihaia* **17** (1): 46—47.1997.

草本。高 70—90 厘米。叶纸质，狭椭圆形至披针形，长约 3—10 厘米，宽 1—4 厘米，背面沿脉被短柔毛，侧脉每边 4—7 条；叶两侧被短柔毛。穗状花序常单生于枝梢叶腋偏于一侧；苞片 4 列，不育苞片近长圆状椭圆形，长约 4 毫米，能育苞片椭圆形，长约 9 毫米，先端均急尖，被小缘毛；花萼裂片长 6 毫米，花冠白色，长 1.6 厘米，外面疏被短柔毛，上唇长 6 毫米，下唇 3 浅裂，中裂片较宽；雄蕊 2，下方药室有距，花柱几无毛。(仅见模式标本照片)

产广西 (那坡，模式标本产地)。生于石灰岩小山、沟谷、溪边。

本种与屏边孩儿草 *Rungia pinpienensis* Lo 近，后者叶近膜质，椭圆形或阔椭圆形，侧脉 9—10 条，不育苞片与能育苞片同形，等大，长约 15 毫米，无缘毛，先端短渐尖。


10. 孩儿草 (中国高等植物图鉴) 图版 41: 1—7

Rungia pectinata (L.) Nees in Dc. Prodr. **11**: 470.1847; T. Anders. in Journ. Linn. Soc. **9**: 517.1867; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 898.1936. 广州植物志: 614.1956; 海南植物志 **3**: 563.1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 177.1975; 云南种子植物名录 (下册): 1684.1984.——*Justicia pectinata* L., Amoen. Akad. **4**: 299.1760.——*Rungia parviflora* sensu Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 247.1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. add. ser. **10**: 200.1912; Merr. in Lingnan. Sci. Journ. **5**: 171. non (Retz.) Nees (nec *Justicia parviflora* Retz. = *Rungia pectinata* (L.) Nees var. *clarkeana* Hand.-Mazz, Symb. Sin. **7**: 898.1936. ——*Rungia parviflora* Nees var. *pectinata* (L.) C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 550.1885; R. Ben. in H. Lec. Fl. Gen Indo-Chine **4**: 759.1935.

一年生纤细草本；枝圆柱状，干时黄色，无毛。叶薄纸质，下部的叶长卵形，长可达 6 厘米，通常 4 厘米左右，顶端钝，基部渐狭或有时近急尖，两面被紧贴疏柔毛；侧脉每边 5 条，常不甚明显；叶柄长 3—4 毫米或过之。穗状花序密花，顶生和腋生，长 1—3 厘米；苞片 4 列，仅 2 列有花，有花的苞片近圆形或阔卵形，长约 4 毫米，背面被长柔毛，膜质边缘宽约 0.5 毫米，被缘毛，无花的苞片长圆状披针形，长约 6.5 毫米，顶端具硬尖头，一侧或有时两侧均有狭窄的膜质边缘和缘毛；小苞片稍小；花萼裂片线形，等大，长约 3 毫米；花冠淡蓝色或白色，长约 5 毫米，除下唇外无毛，上唇顶端骤然收狭，下唇裂片近三角形。蒴果长约 3 毫米，无毛。花期早春。

产广东 (广州、云浮)、海南 (三亚、昌江、儋州、保亭吊罗山)、广西 (玉林、龙州、白色)、云南 (蒙自、芒市、墨江、镇康、勐腊、普文、勐罕、潞西、腾冲、勐仑)。生于草地上，为一常见的野生杂草。印度、斯里兰卡、泰国、中南半岛也有分布。

据《广州植物志》载：取全草煎服，有去积、除滞、清火之效。



图版 41 1—7. 孩儿草 *Rungia pectinata* (L.) Nees: 1. 植株, 2. 穗状花序正反面, 3. 无花苞片, 4. 有花苞片, 5. 花冠及雄蕊, 6. 药室和花丝, 7. 开裂蒴果。(林 泉绘)