

米，无毛；宿存萼裂片长约 5 毫米。”

C. B. Clarke 于 1904 年曾将采自云南思茅南山林的 A. Henry 11784 定为 *Rungia henryi* C. B. Clarke，即南鼠尾黄（《云南种子植物名录》2: 1684.1984.）。该种与本种相近，但作者仅见本种模式标本照片，未能将广西标本与云南标本相比较，而二者的分布也相近，是否同一种，有待仔细观察和比较花序和苞片特征后，再定。

13. 匍匐鼠尾黄（云南种子植物名录）

Rungia stolonifera C. B. Clarke, in Hook. f. Fl Brit. Ind. **4**: 547.1885; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**: 489.1911; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **5**: 161—308. (?) 1912; 云南植物名录（下册）: 1685.1984.——*Justicia stolonifera* (C. B. Clarke) B. Hansen in Nordic Journ. Bot. **9** (2): 210.1989.

直立草本，高 30—60 厘米，分枝，下部节上生根。茎 4 棱，节间相对面槽中有毛，线形钟乳体纵列。叶具柄，柄长 0.5—1 厘米，叶片卵形，长 2.5—7.5 厘米，宽 1.8—3.8 厘米，两端急尖，上面深绿色，背面淡绿色，边波状，几全缘，边缘稍被微毛，侧脉每边 5 条。穗状花序顶生和腋生；苞片倒卵形，匙形，顶端圆，被微毛，长 4 毫米，宽 3 毫米，具干膜质边缘；小苞片卵状披针形，几与苞片等长；花萼光滑，长 1.3 厘米，5 深裂，裂片狭披针形，干膜质。花冠长 1.2—1.6 厘米，冠管长 8 毫米，宽 2—3 毫米，狭圆柱形，直立；冠檐长 4 毫米，2 唇形，上唇三角形，直立，全缘，下唇 3 裂；花丝着生于冠檐基部，白色无毛，药室紫黑色，一上一下，下药色基部有白色距；花柱长，柱头圆形，伸出。蒴果长 3—4 毫米，几光滑；胎座自基部弹起。种子稍被腺状乳头状凸起，成熟时光滑。（模式标本未见）

产云南（寻甸、禄丰、峨山、景东、凤庆、腾冲、瑞丽、临沧、思茅、勐海、普安、蒙自、屏边、禄春、文山、临沧）。分布于印度东北部和孟加拉国，模式标本采自印度卡西山。

14. 台湾明萼草（台湾植物志）

Rungia taiwanensis Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **43** (2): 61.1968; C. F. Hsieh & T. C. Huang in Taiwania **19** (1): 22.1974. et Fl. Taiwan **4**: 658.1978; ed. 2. **4**: 676.1998.——*Rungia parviflora* Nees var. *pectinata* sensu Matsum. et Hayata in Journ. Coll. Sci Univ. Tokyo **22**: 294.1906. (Enumer. Pl. Form.) non C. B. Clarke——*Rungia parviflora* sensu Masamune, List vasc. Pl. Taiwan 106.1954. non Nees

草本，高达 40 厘米，茎匍匐，下部节上生根，节间稍有 2 列硬毛。叶膜质，具长柄，叶片卵状长圆形或长圆状披针形，长 2.5—8 厘米，宽 2—3.5 厘米，顶端渐尖，基部楔形或渐尖，边缘波状，两面近光滑。穗状花序长达 4 厘米，通常单一，顶生或腋生，总花梗长 1—2 厘米，不育苞片长圆状披针形，长 8—9 毫米，宽 2—3 毫米，干质边缘狭，具纤毛，能育苞片卵形或卵状披针形，干质边缘宽，被纤毛；小苞片卵形长约