

59. 灵枝草属 * *Rhinacanthus* Nees

Nees in Wall., Pl. As. Rar. 3: 76, 108.1832, et DC. Prodr. 11:
442.1847; C. B. Clarke in Fl. Brist. Ind. 4: 541.1885.

直立草本或亚灌木，有时攀援状。叶全缘或浅波状。花大，无梗，组成圆锥花序，苞片和小苞片小，钻形，较花萼片短；萼深5裂，裂片线状披针形；花冠高脚碟形，冠管细长，圆柱形，喉部稍扩大，冠檐2唇形，上唇线形或披针形，下弯或旋卷，下唇宽大，伸展，深3裂，冠檐裂片覆瓦状排列；雄蕊2枚，着生于花冠喉部，比花冠裂片短，花药2室，药室叠生或一上一下，钝无距，花粉粒长球形，极面观为钝三角形；花盘杯状；子房每室有胚珠2粒，花柱细丝状，柱头全缘或不明显的2裂。蒴果棍棒状；种子每室2粒，近圆形，两侧压扁。

约7—25种，分布于热带非洲、马达加斯加、索科特拉岛、印度、马来西亚、泰国、中南半岛，东北达我国滇南。我国产3种，全产于云南，海南有1种栽培。

属名模式：*Rhinacanthus communis* Nees nom. illeg. [= *Rhinacanthus nasutus* (L.) Lindau]

分种检索表

1. 叶大，约长20—24厘米，宽6—8厘米，无毛或近无毛。花较大，冠管约3—4厘米，冠檐裂片长1.25—2.5厘米。
 2. 叶柄极短或无。花较大，花冠极扩大，冠管长4厘米 1. 滇灵枝草 *R. beesianus* Diels
 2. 叶柄长达3.8厘米，花较小，花冠高脚碟形，冠管细长，长3厘米
..... 2. 滑液灵枝草 *R. calcaratus* (Wall.) Nees
1. 叶小，通常长4.5厘米，宽1.7厘米，最大长达10厘米，宽4厘米。花较小，冠管长2厘米，冠檐裂片长5毫米，宽4毫米 3. 灵枝草 *R. nasutus* (L.) Kurz

1. 滇灵枝草（云南种子植物名录）

***Rhinacanthus beesianus* Diels** in Not. Bot. Gard. Edinb. 5: 164.1912; 云南种子植物名录（下册）2: 1683.1984.

茎高0.9—1.5米，几光滑。叶（仅指上部的）具极短柄或无柄，膜质至草质，狭倒卵形或倒披针形，两端变狭，顶端渐尖，边缘具不明显波齿或近全缘，上面极少疏柔毛，背面光滑，长20—24厘米，宽6—8厘米；侧脉每边8—10条，不明显。圆锥花序

* 灵枝草属（中国种子植物科属辞典）*Rhinacanthus* Nees，又名白鹤灵枝草属（中国种子植物科属辞典修订版）