

平展时长 12 毫米，淡绿色，内外均被短柔毛，冠檐上唇直立，拱形，顶端齿状 2 裂，下唇伸展，深 3 裂，冠檐裂片长圆状披针形，近急尖，长约 3 毫米，宽约 0.6 毫米；发育雄蕊花丝约长 4 毫米，被疏柔毛，花药长约 2 毫米；不育雄蕊丝状，长约 2 毫米，被疏柔毛；子房无毛，花柱长约 6 毫米，有疏柔毛。蒴果棒锤形，长约 2 厘米；种子未见。花期夏季。

产海南 [保亭 (模式标本产地)、万宁]。生于中海拔密林下。海南特产。

61. 珊瑚花属 *Cyrtanthera* Nees

Nees in C. f. P. Martius, Fl. Brasil. 9: 99. 1847. et in DC. Prodr. 11: 328. 1847.

灌木，茎粗壮。叶宽大，具柄。聚伞圆锥花序顶生，极密，多花，花大而狭，深红色，美丽，在枝上偏向一侧，苞片和小苞片比花萼长而宽，通常有色，柔软。花萼不等 5 深裂或 5 浅裂，裂片有色，柔软，披针形。花冠张开，冠管长，唇瓣不等深裂，上唇折叠成线状—镰刀形，下唇为伸长倒圆锥形，顶端 3 浅裂，裂片短，靠合着，中央的通常较狭，顶端外弯折叠。雄蕊 2，着生于冠管基部，在上唇纵向贴生至中部，顶端弯曲。花药稍俯垂，短，2 室，边缘膜质，通常半新月形，顶端外弯，龙骨状凸起的药隔分开使之偏向一侧，一室稍短，无芒。柱头钝，单唇。果不详。属名模式未指定。(NCU-3 未列此属)

1. 珊瑚花 图版 42: 1—4

Cyrtanthera carnea (Lindl.) Bremek. Verh. Ned. Akad. Wetensch. Naturk. Afd. Sect. 2. 45 (21): 50—52. 1948; 中国高等植物图鉴 4: 178 图 5769. 1975. ——*Jacobinia carnea* (Lindl.) Nichols.

草本或半灌木；茎 4 棱形，高达 1 米左右，具叉状分枝。叶具柄，卵形、距圆形至卵状披针形，长 9—15 厘米，宽 4.5—8.5 厘米，顶端渐尖，基部阔楔形，下延，边全缘或微波状，侧脉每边 6 条，上面深绿色，背面淡绿色，侧脉在背面凸起，明显。穗状花序组成的圆锥花序穗状，顶生，长达 8 厘米，脱落时真整个花序连同下部叶状苞片一起脱落；苞片矩圆形，长约 2 厘米，顶端急尖，基部楔形，具柄，边缘有缘毛；小苞片 2，条形，长 1.5 厘米，宽 2 毫米；花萼裂片 5，条状披针形，近等大，长 0.6—1 厘米；花粉红紫色，长约 5 厘米，具黏毛，2 唇形，花冠筒稍短或与唇瓣等长，上唇顶端微凹，下唇反转，顶端 3 浅裂；雄蕊 2，外露，着生于喉部，花丝丝状，长 2.5 厘米，2 药室不等高，药隔宽。蒴果有 4 粒种子。

原产巴西；我国多在温室中栽培，南方室外也可栽培。

过去将本种定为 *Jacobinia coccinea* Hiern.，本属与 *Jacobinia* 属的区别在于：① 花萼