

深裂，较小；② 药室较短，且稍弯；③ 具宽药隔。

62. 麒麟吐珠属* *Calliaspidia* Bremek.

Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. Naturk. Afd. Sect. 2.45
(2): 54.1948.

草本。叶有柄，等大，对生。穗状花序顶生；苞片卵状心形，覆瓦状排列，仅2列生花，其余的无花；小苞片较苞片稍小，比花萼长1倍；花萼深5裂，裂片狭窄，急尖；花单生于苞腋，花冠白色，有红色糠秕状斑点，冠管狭钟形，喉部短，冠檐2唇形，冠檐裂片近相等；覆瓦状排列；上唇直立，全缘或微缺，具柱槽，下唇3浅裂，具喉凸，不明显反折。雄蕊2枚，与上唇近等长，花药2室，药室一上一下，均具短尾；花粉粒桶形，3孔，孔的两侧各有1列稍大的盾状雕纹；花盘马蹄形；子房每室有胚珠2粒，花柱无毛，蒴果棒状；种子两侧呈压扁状，无毛。

仅1种，原产墨西哥。全世界热带和亚热带地区都有栽培。

属名模式：*Calliaspidia guttata* (F. S. Brandege) Bremek. (NCU-3 未列本属)

1. 虾衣花 (中国高等植物图鉴) 麒麟吐珠 (海南植物志) 图版 42: 5—8

Calliaspidia guttata (Brandegee) Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. Naturk. Afd. Sect. 2.45 (2): 54.1948; 海南植物志 3: 571—571.1974; 中国高等植物图鉴 4: 177. 图 5768.1975. ——*Beloperone guttata* F. S. Brandege in Univ. Calif. Publ. Bor. IV: 278.1912; Bailey Man. Cult. Plants 924.1949. ——*Justicia brandegesana* Wassh. et L. B. Smith in Fl. Illustr. Catar., pt. 1. Acanthac. : 102.1969.


多分枝的草本，高20—50厘米；茎圆柱状，被短硬毛。叶卵形，长2.5—6厘米，顶端短渐尖，基部渐狭而成细柄，全缘，两面被短硬毛。穗状花序紧密，稍弯垂，长6—9厘米；苞片砖红色，长1.2—1.8厘米，被短柔毛；萼白色，长约为冠管的1/4；花冠白色，在喉凸上有红色斑点，长3.2厘米，伸出苞片之外，冠檐深裂至中部，被短柔毛。蒴果未见。

在我国南部的庭园和花圃中极常见，盆栽或露地栽种均生长良好，如海南海口人民公园有栽培。而中部地区须在温室内越冬。原产墨西哥，美国佛罗里达逸生。

63. 黄脉爵床属 *Sanchezia* Ruiz et Pavon.

Ruiz & Pavon. Prod. 5.t. 32 1794; Benth. & Hook. f. ii.

* 麒麟吐珠属 (海南植物志) *Calliaspidia* Bremek., 又名虾衣花属 (中国高等植物图鉴)。



图版 42 1—4. 珊瑚花 *Cyrtanthera carnea* (Lindau.) Bremek.: 1. 部分植株示花序, 2. 花冠剖面示雄蕊, 3. 花萼裂片, 4. 雄蕊示药室与花丝。5—8. 虾衣花 *Calliaspidia guttata* (Brandegee.) Bremek.: 5. 部分植株示花序, 6. 花冠剖面示雄蕊, 7. 花萼裂片, 8. 雄蕊示药室与花丝。(余汉平绘)