

或1大1小，稍叠生，1室稍高于另1室，基部无附属物或有球状附属物；子房每室有胚珠2粒，柱头单一。蒴果近木质，有毛或无毛，上部具4种子。种子压扁或稍压扁，圆形，具皱小瘤或蜂窝状，或平滑。

约5种，分布于非洲、印度、马来西亚、中南半岛至我国华南、西南。我国有1种，栽培或半野生。属名模式未指定。

1. 鸭嘴花 (广州植物志) 野靛叶，大还魂 (广州)，鸭子花 (植物名实图考)

图版 43: 1—7

Adhatoda vasica Nees in Wall. Pl. As. Rar. **3**: 103.1832; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind **4**: 540.1885; 广州植物志: 617.1956; 海南植物志 **4**: 571.1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 174.1975; 云南种子植物名录 (下册): 1668.1984; 新华本草纲要 **2**: 481.1991. — *Justicia adhatoda* L. Sp. Pl. 15.1753; Benth. Fl. Hongk. 264.1861; Frobes & Hemsl. in Linn. Soc. Bot. **26**: 244.1890; R. Ben. in H. Lec. Fl. Gen. Indo-Chine **4**: 742.1935.

大灌木，高达1—3米；枝圆柱状，灰色，有皮孔，嫩枝密被灰白色微柔毛。叶纸质，矩圆状披针形至披针形，或卵形或椭圆状卵形，长15—20厘米，宽4.5—7.5厘米，顶端渐尖，有时稍呈尾状，基部阔楔形，全缘，上面近无毛，背面被微柔毛；中脉在上面具槽，侧脉每边约12条；叶柄长1.5—2厘米。茎叶揉后有特殊臭气。穗状花序卵形或稍伸长；花梗长5—10厘米；苞片卵形或阔卵形，长1—3厘米，宽8—15毫米，被微柔毛；小苞片披针形，稍短于苞片，萼裂片5，矩圆状披针形，长约8毫米；花冠白色，有紫色条纹或粉红色，长2.5—3厘米，被柔毛，冠管卵形，长约6毫米；药室椭圆形，基部通常有球形附属物不明显。蒴果近木质，长约0.5厘米，上部具4粒种子，下部实心短柄状。

产广东、广西、海南 (海口人民公园和儋州)、澳门、香港、云南等地栽培或逸为野生。上海栽培。分布于亚洲东南部。原产地不明，最早在印度发现。


药用，续筋接骨，祛风止痛，祛痰。

65. 杜根藤属* *Calophanoides* Ridl.

Ridl. in Fl. Malay Penins. **2**: 592.1923.

草本或亚灌木。叶通常全缘或有时稍带浅波状。花具短梗，腋生，单生或簇生，有时组成少花的聚伞花序；苞片通常圆形或匙形，小苞片小或无；萼5深裂，裂片等大，狭窄，急尖。花冠白色或稍带绿色，冠管短，漏斗状，喉部扩大，冠檐与冠管近等长，

* 杜根藤属 (中国种子植物科属词典) *Calophanoides* Ridl., 又名赛爵床属 (海南植物志)。



图版 43 1—7. 鸭嘴花 *Adhatoda vasica* Nees: 1. 部分植株, 2. 花冠剖面示雄蕊, 3. 萼裂片, 4. 苞片, 5. 雄蕊示药室与花丝, 6. 花粉粒, 7. 蒴果。8—9. 紫苞野靛棵 *Mananthes latiflora* (Hemsl.) C. Y. Wu et C. C. Hu:

8. 部分植株, 9. 花萼裂片。(余汉平、李爱莉绘)