

16. 叶干后背面不为锈色; 茎干后非暗紫色; 穗状花序长约 7—14 厘米
 13. 琴叶野靛棵 *M. panduriformis* (R. Ben.) C. Y. Wu et C. C. Hu
14. 叶基部不为心形或耳形。
17. 总花梗短, 密集。花轴密被柔毛, 花 2—4 朵组成小聚伞花序对生于总花梗上, 苞片和小苞片线状披针形
 12. 小齿野靛棵 *M. microdonta* (W. W. Sm.) C. Y. Wu et C. C. Hu
17. 总花梗较长, 稀疏。
18. 花无梗, 萼裂片长约 2—3 毫米
 10. 南岭野靛棵 *M. leptostachya* (Hemsl.) H. S. Lo
18. 花序下部的花有梗; 萼裂片长约 5 毫米
 6. 大明野靛棵 *M. damingensis* H. S. Lo

1. 棱茎野靛棵 (新拟) 棱茎爵床 (广西植物)

Mananthes acutangula (H. S. Lo et D. Fang) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. — *Justicia acutangula* H. S. Lo et D. Fang, in Guihaia (广西植物) 17 (1): 56. 1997.

草本, 高达 1 米; 茎锐方柱形, 稀具宽达 1 毫米的翅, 有 4 沟。叶椭圆形, 稀阔卵形, 长 8.5—27 厘米, 宽 5—12.5 厘米, 侧脉每边约 13—14 条。穗状花序长 3.5—14 厘米, 间断, 生于枝端和上部叶腋; 苞片三角形, 长 2—3 毫米, 每苞有 1 花; 小苞片长约 2.5 毫米; 花萼长约 5 毫米, 5 裂, 裂片内缘密被微柔毛; 花冠淡绿黄色, 长 2—2.2 厘米, 上唇长 9 毫米, 钝, 下唇与上唇等长, 3 浅裂, 冠檐裂长约 2 毫米, 中裂片较阔; 雄蕊 2, 下方一药室具 1 极小的距; 花柱长约 20 毫米。

产广西 [马山 (模式标本产地, 仅见模式标本照片)、忻城]。生于海拔 520 米石灰岩山上, 林中。

本种萼裂片内缘被微绒毛, 而与云南产的野靛棵 *Mananthes patentifolia* (Hemsl.) Bremek. (= *Justicia patentiflora* Hemsl.) 极近似, 但茎锐方柱形; 叶侧脉每边约 13—14 条; 萼长约 5 毫米; 花冠长 20—22 毫米, 上唇与下唇等长; 花柱长约 20 毫米。

2. 钝萼野靛棵 (新拟) 钝萼爵床 (广西植物)

Mananthes amblyosepala (D. Fang et H. S. Lo) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. — *Justicia amblyosepala* D. Fang et H. S. Lo, in Guihaia (广西植物) 17 (1): 55. 1997.

小灌木, 高 30—50 厘米。叶卵形至椭圆形, 长 9—17 厘米, 宽 4.5—8 厘米, 侧脉每边 5—7 条。穗状花序顶生或腋生, 长 2—23 厘米, 间断; 苞片三角形, 稀狭三角形, 长 1.5—3 毫米, 每苞一花; 小苞片狭三角形, 长 2 毫米; 花萼 5 裂, 裂片长圆形, 长 3 毫米, 先端钝, 疏被腺毛, 或微绒毛, 或近无毛, 边被小缘毛; 花冠淡黄色, 长 13