

毫米，外被倒向微毛，上唇长 5 毫米，钝，下唇 3 浅裂，冠檐裂长约 1.5 毫米；雄蕊 2，下方药室有距；花柱疏被微毛。

产广西（那坡，模式标本产地，仅见模式标本照片）。生于石灰岩山上，林中。

据原文载：本种与泰国的 *Justicia decumbens* Craib 接近，但那种叶长圆形，苞片和小苞片线形，萼片线状披针形，先端急尖，花冠白色极易区别。

3. 桂南野靛棵（新拟） 桂南爵床（广西植物）

Mananthes austroguanxiensis (H. S. Lo et D. Fang) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. —— *Justicia austroguanxiensis* H. S. Lo et D. Fang, in *Guihaia* (广西植物) 17 (1): 54. 1997.

3a. 桂南野靛棵（原变种）

var. *austroguanxiensis*

草本，高 15—30 厘米，茎短，节很密。叶常密聚于茎上成莲座状排列，倒卵形或倒卵状椭圆形，稀椭圆形。长（6—）10—15 厘米，宽约（2.5—）4—7（—9）厘米，顶端短尖，基部渐狭或短渐尖，下延，全缘，无毛，上面具极密点状钟乳体，侧脉 7—8 对，近叶缘弧曲，上面绿色，背面黄绿色。穗状花序常近茎稍腋生，长 5—35 厘米，间断；苞片和小苞片三角形，稀长三角形，长 1—1.5—2 毫米；萼长 1.5—2 毫米，5 裂，裂片钻形；花冠淡黄绿色，外面被微柔毛，长约 8—9 毫米，上唇微缺，下唇 3 浅裂，中裂片宽于侧裂片；雄蕊 2，花药下方一室有距。

产广西〔龙州（模式标本产地，仅见模式标本照片）、大新、宁明、崇左、隆安、扶绥〕。生于石灰岩山上，林中。约海拔 350 米。

3b. 白脉野靛棵（新拟）（变型） 白脉爵床（广西植物）

Mananthes austroguanxiensis (H. S. Lo et D. Fang) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. f. *albinervia* (D. Fang et H. S. Lo) C. Y. Wu et C. C. Hu —— *Justicia austroguanxiensis* H. S. Lo et D. Fang f. *albinervia* D. Fang et H. S. Lo, in *Guihaia* (广西植物) 17 (1): 55. 1997.

本变型叶的中脉和侧脉活时上面变白色，干时两面多少变紫色，而与原种不同。

为一庭园绿化植物，广西南宁和桂林已有栽培。

4. 华南野靛棵（新拟） 华南爵床（广西植物）

Mananthes austrosinensis (H. S. Lo) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. —— *Justicia austrosinensis* H. S. Lo, in *Guihaia* (广西植物) 17 (1): 52. 1997.

草本，高通常 40—70 厘米，茎 4 棱，有槽，槽内交互有白色毛。叶卵形，阔卵形或近椭圆形，稀长圆状披针形，长 5—10（—15）厘米，有粗齿或全缘，上面散生硬毛，背面中脉上被硬毛；侧脉每边约 5 条。穗状花序腋生和顶生，密花或有时间断；苞片扇形，有时阔卵形，长 5—7 毫米，宽 6—9 毫米，顶端有 1 或 3 个短尖头，有时