

粒，花柱无毛，顶端钝，浅2裂。蒴果未见。

产广西（大明山，模式标本产地，见到模式标本）。

据原文载，本种与南岭野靛棵 *Mananthes leptostachya* (Hemsl.) H. S. Lo 的区别是叶脉较少，约5对，纤细；与广东野靛棵 *Mananthes lianshanica* H. S. Lo 的区别是叶基楔形，花冠、萼裂片和苞片近无毛或被微柔毛；与二者都不同的是花序下部的花有花梗。

7. 锈背野靛棵（新拟） 锈背爵床（广西植物）

Mananthes ferruginea (H. S. Lo et D. Fang) C. Y. Wu et C. C. Hu comb. nov. ——*Justicia ferruginea* H. S. Lo et D. Fang, in Guihaia (广西植物) 17 (1): 58. 1997.

草本，高过20厘米；茎暗紫色。叶无柄，倒披针形，少有披针形，长8—17厘米，宽2.5—6.5厘米，基部耳形，略抱茎，干时背面变锈色，侧脉每边约10—13条。穗状花序长1.5—5厘米，间断，腋生；苞片每枚有5—1朵花，和小苞片均为三角形，长不足1毫米；花萼5裂，裂片狭三角形，长1—1.5毫米；花冠白色，长6.5—7毫米，外被微毛，上唇3毫米，钝，下唇3浅裂，冠檐裂长约1毫米；雄蕊2，药室下方一枚有距；子房无毛，花柱几无毛。

产广西（龙州，模式标本产地，仅见模式标本照片）。生于石灰岩林中。

本种与琴叶爵床 *Justicia panduriformis* R. Ben. 近似，但那种叶大，长15—26厘米，宽7.5—15厘米，背面干时不为锈色，侧脉每边8—10条；穗状花序长约7—14厘米；总花梗长约15厘米。

8. 那坡野靛棵（新拟） 那坡爵床（广西植物）

Mananthes kampotensis (R. Ben.) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. ——*Justicia kampotensis* R. Ben. in Notul. Sys. 5: 118. 1935; in H. Lec., Fl. Gén. Indo-Chine 4: 741. 1936; 广西植物 17 (1): 57. 1997.

灌木。幼枝近4棱形，光滑，具纵沟，后近圆柱形。叶具短柄，披针形，基部急尖，顶端短渐尖。边全缘，长9—16厘米，宽4.3—5厘米，叶片两面光滑，侧脉每边8条。花序腋生或顶生，花在花序三出；花序轴近光滑，四棱，花着生处增大。苞片和小苞片狭三角形，长1.5毫米，对生；花无梗，花萼5裂，近相等，线形，急尖，基部分离，长3毫米，被短柔毛。冠管较冠檐长，在喉部下稍稍扩大；上唇近三角形，顶端平截，下唇短3裂，冠檐裂片近相等。雄蕊2，着生于喉部稍下，花时光滑；花药室不等，下药室有距。子房和花柱光滑。蒴果光滑，下半部狭而不育。

产广西西部（那坡）。生于石山林中，海拔590米。与柬埔寨（模式标本产地）间断分布。