

67. 驳骨草属* *Gendarussa* Nees

Nees in Wall., Pl. As. Rar. **3**: 76, 103.1832; et in DC. Prodr. **11**: 410.1874.

亚灌木或多年生草本。叶全缘。花近无梗，组成顶生穗状花序；苞片对生，每苞片中有花1至数朵；小苞片比萼短；萼近相等的5深裂，裂片三角状披针形，花冠2唇形，管圆柱状或基部稍阔，喉部稍扩大，上唇拱形，长圆状卵形，直立，内凹，下唇伸展，3裂，有喉凸，裂片覆瓦状排列；雄蕊2枚，花丝稍扁，向上渐细小，无毛，花药2室，具阔而斜的药隔，其中1室高于另一室的中部，较低的1室棒形，稍叉开且基部有尾状附属物，花粉粒椭圆形，有3个萌发孔，孔的两侧有增厚带；子房无毛，每室有胚珠2，花柱线形。蒴果狭棒状，具4种子，基部坚实；种子每室2粒。

已知约3种，分布在亚洲东南部、印度至中国、菲律宾、马来西亚。我国产2—4(?)种，广东、海南、台湾均有。

属名模式(选模式): *Gendarussa vulgaris* Nees

分种检索表

1. 叶狭披针形至披针状线形；苞片较小，不重叠 2. 小驳骨 *G. vulgaris* Nees
 1. 叶椭圆至倒卵形；苞片大，阔卵形或近圆形，覆瓦状重叠
 1. 黑叶小驳骨 *G. ventricosa* (Wall.) Nees

1. 黑叶小驳骨(新拟) 黑叶接骨草(海南植物志)，大驳骨(中国高等植物图鉴) 图版45: 6—12

Gendarussa ventricosa (Wall. ex Sims.) Nees in Wall. Pl. As. Rar. **3**: 104.1832; 海南植物志 **4**: 569.1974. — *Justicia ventricosa* Wall. ex Sims. in Curtis' Bot. Mag. tab. 2760.1827; Wall., Pl. As. Rar. **1**: 80 t. 93.1830; T. Anders in Journ. Linn. Soc. Bot. **9**: 509.1867; Kerr. For. Fl. Brit. Burm. **2**: 248.1877; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 526.1885; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 247.1890; Williams in Bull. Herb. Boiss **5**: 426.1925; Craib in Kew Bull. ; 441.1911; Dunn et Tutch. in Kew Bull. add. ser. **10**: 209.1912; R. Ben. in H. Lec. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 743.1935. — *Adhatada ventricosa* (Wall.) Nees in DC. Prodr. **11**: 107.1848; Merr.

* 驳骨草属(中国种子植物科属辞典修订版) *Gendarussa* Nees, 又名接骨草属(海南植物志)、尖尾凤属(台湾植物志)。

& Chun in *Sunyatsenia* 5: 184.1940; 中国高等植物图鉴 4: 174.1974.

多年生、直立、粗壮草本或亚灌木，高约 1 米，除花序外全株无毛。叶纸质，椭圆形或倒卵形，长 10—17 厘米，宽 3—6 厘米，顶端短渐尖或急尖，基部渐狭，干时草黄色或绿黄色；常有颗粒状隆起；中脉粗大，腹面稍凸，背面呈半柱状凸起，侧脉每边 6—7 条，两面近同等凸起，在背面半透明；叶柄长 0.5—1.5 厘米。穗状花序顶生，密生；苞片大，覆瓦状重叠，阔卵形或近圆形，长 1—1.5 厘米，宽约 1 厘米，被微柔毛；萼裂片披针状线形，长约 3 毫米；花冠白色或粉红色，长 1.5—1.6 厘米，上唇长圆状卵形，下唇浅 3 裂。蒴果长约 8 毫米，被柔毛。 花期冬季。

产我国南部和西南部：广东、海南东南部、香港、广西、云南。生于近村的疏林下或灌丛中。野生或栽培。越南至泰国、缅甸也有分布。模式标本采自缅甸庇古。（模式标本未见）

全草入药，有续筋接骨、祛风湿之效，可治骨折、跌打扭伤、关节炎、慢性腰腿痛等。

本种的位置尚无肯定的结论，以花序顶生，花粉粒椭圆形而论，与接骨草 *Gendarussa vulgaris* Nees 颇近似，而且两种的花特征也大致相同，故暂置本属。

2. 小驳骨（中国高等植物图鉴） 接骨草（海南植物志），尖尾凤（台湾植物志）图版 45: 1—5

Gendarussa vulgaris Nees in Wall. Pl. As. Rar. 3: 104.1832. et in DC. Prodr. 11: 410.1847; 海南植物志 4: 569.1974; 中国高等植物图鉴 4: 194.1975; 台湾植物志 4: 632.pl. 1135.1978. — *Justicia gendarussa* Burm. f. Fl. Ind. 10.1768; Matsum. et Hayata in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 22: 293.1906; C. F. Hsieh et T. C. Huang, Fl. Taiwan ed. 2.4: 665.pl. 304.1998. — *Jussicia gendarussa* L. f. Suppl. 85.1781; Sims in Curtis' Bot. Mag. 19: t. 635.1802; Roxb. Fl. Ind. 1: 128.1820; Benth. Fl. HongKong : 264.1861; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 532.1884; Frobes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 245.1890; Craib in Kew Bull. : 440.1911; Dunn et Tutch. in Kew Bull. add ser. 10: 200.1912.

多年生草本或亚灌木、直立、无毛，高约 1 米；茎圆柱形，节膨大，枝多数，对生，嫩枝常深紫色。叶纸质，狭披针形至披针状线形，长 5—10 厘米，宽 5—15 毫米左右，顶端渐尖，基部渐狭，全缘；中脉粗大，在上面平坦，在背面呈半柱状凸起，和侧脉每边 6—8 条，均呈深紫色或有时侧脉半透明；叶柄长在 10 毫米以内，或上部的叶有时近无柄。穗状花序顶生，下部间断，上部密花；苞片对生，在花序下部的 1 或 2 对呈叶状，比萼长，上部的小，披针状线形，比萼短，内含花 2 至数朵；萼裂片披针状线形，长约 4 毫米，无毛或被疏柔毛；花冠白色或粉红色，长 1.2—1.4 厘米，上唇长圆状卵形，下唇浅 3 裂。蒴果长 1.2 厘米，无毛。 花期春季。



图版 45 1—5. 小驳骨 *Gendarussa vulgaris* Nees: 1. 部分植株示花序, 2. 花, 3. 花冠剖面示雄蕊, 4. 花萼裂片, 5. 雄蕊示药室与花丝。6—12. 黑叶接骨草 *G. ventricosa* (Wall. ex Sims.) Nees: 6. 部分植株, 7. 花, 8. 花冠剖面示雄蕊, 9. 花萼, 10. 花萼裂片, 11. 雄蕊示药室与花丝, 12. 苞片及小苞片。(余汉平绘)