

var. **hedyotidifolia** (Nees) C. Y. Wu, in Index Fl. Yunnan (云南种子植物名录) 2: 1683.1984. — *Rostellularia hedyotidifolia* Nees in Wall. Pl. As. Rar. 3: 100.1832; et in DC. Prodr. 11: 370.1847; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 7: 161—164.1912.

一年生草本。茎直立，高 20 厘米，基部两歧分枝或多分枝，茎中部叶长过 2.5 厘米，顶端和分枝上的较短，叶片卵形，急尖，粗糙，顶端具不规则圆齿，边缘和脉粗糙。穗状花序顶生和间断的腋生，苞片具刚毛，与萼等长，小苞片长为花萼的 1/2，具刚毛；花萼长 3 毫米，5 深裂，裂片狭披针形，渐尖，边缘膜质，边缘光滑，渐尖头具细锯齿粗糙，上面的 2 裂片稍短。花冠线形，灰白色紫色。（可能产滇西、滇西南，但未见标本）

1c. 小叶散爵床 (海南植物志，云南种子植物名录) (变种)

var. **prostrata** (Roxb. ex C. B. Clarke) H. S. Lo, in Fl. Hainan (海南植物志) 3: 570. et 598 (Addenda). 1974. — *Justicia diffusa* var. *prostrata* Roxb. ex C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 538.1885.

披散草本，高 15—30 厘米。茎 4 棱柱形，稍被短柔毛。叶卵形或近圆形，有时椭圆形，长 7—10 毫米，稀达 15 毫米，两面均有粗大、排列规则的钟乳体；叶柄短，被毛。穗状花序顶生，长 2.5—5 厘米，宽约 4 毫米，被毛；苞片线状披针形，和小苞片以及萼裂片均被硬毛；花萼 4 裂，裂片线状披针形，长约 4 毫米；花冠长约 6 毫米。蒴果长 3—4 毫米，被柔毛；种子近平滑。花期春季。

产海南（琼东、崖县、白沙）、福建（福州鼓岭）、台湾。生于草地上。分布于印度（德干高原）、斯里兰卡、泰国和越南。

2. 矮爵床 (海南植物志)

Rostellularia humilis H. S. Lo, in Fl. Hainan (海南植物志) 3: 598 (Addenda) & 570.1974.

矮小直立草本，高（连花序）6—8 厘米，近基部分枝，干时茶褐色，全株无毛；枝有 4 棱，常膝曲。叶无柄，稍厚，披针形或狭披针形，长 1—2 厘米，宽约 3 毫米，顶端钝，钟乳体纤细，不明显。穗状花序顶生，长 2—4.5 厘米，通常与茎等长或稍长，稠密多花，宽约 5 毫米。花未见。宿存苞片小和小苞片均线状披针形，长约 3 毫米，边缘膜质；萼裂片近线形，长约 5 毫米，亦具膜质边缘，钝头。蒴果长约 6 毫米，无毛。

产海南（儋州，模式标本产地）。海南特产。

3. 喀西爵床 (云南种子植物名录)

Rostellularia khasiana (C. B. Clarke) C. Y. Wu, in Index Fl. Yunnan. (云南种子植物名录) 2: 1683.1984. — *Justicia khasiana* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 537.1885; Collatt & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 28: 106.1905; Craib in Kew Bull. : 440.1911.