

3a. 喀西爵床 (原变种)

var. **khasiana**

草本。高 60—100 厘米，茎直立，伸长，4 棱，被多节长硬毛，叶无柄或具短柄，叶片矩圆形，顶端急尖，钝，全缘，基部宽楔形，长约 4 厘米，宽 2.5 厘米，两面被多节长硬毛。穗状花序长 2.5—4 厘米，基部很少间断，明显地被硬毛，苞片狭，线状矩圆形，长 8 毫米，宽 2—3 毫米，被硬毛；花萼近线形，被硬毛。花冠长 8—12 毫米。蒴果长 8 毫米，椭圆形。种子明显具条纹；种皮稍网状。(未见模式标本)。

分布于印度东北 [阿萨姆、卡西山区，模式产地，标本未见]、缅甸、泰国。海拔 1500 米。我国不产。

3b. 宽穗爵床 (云南种子植物名录) (变种)

var. **latispica** (C. B. Clarke) C. Y. Wu, in Index Fl. Yunnan. (云南种子植物名录) **2**: 1684.1984. — *Rostellularia procumbens* auct. non (L.) Nees in DC. Prodr. **11**: 371.1847. — *R. mollissima* Nees in DC. Prodr. **11**: 373.1847. — *Justicia procumbens* var. *latispica* C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. **4**: 539.1885; Hand.-Mazz., Sym. Sin. **7**: 899.1936.

植株较粗壮，穗状花序较大，苞片和花冠较长。

产云南 (大理)。生于山谷疏林中，路边，海拔 2100—2700 米。模式标本产地为印度卡西山区。(模式标本未见)。

4. 两广线叶爵床 (植物分类学报) 狭叶爵床 (台湾植物志)

Rostellularia linearifolia Bremek. subsp. **liankwangensis** H. S. Lo in Acta Phytotax. Sin. **17** (4): 87.1979. — *Justicia linearifolia* (Bremek.) H. S. Lo in Guihaia **17** (1): 58.1997. — *Justicia linearifolia* ssp. *liankwangensis* H. S. Lo in ibid. **17** (1): 59.1997.

本亚种的花序轴被硬毛，叶宽 2—4.5 毫米；线叶爵床 *R. linearifolia* Bremek. subsp. *linearifolia* 的花序无毛，叶宽 1.2—1.4 毫米 (老挝和泰国)，故二者区别明显。

产广西 (南宁、柳城)、广东 (廉江)。模式标本采自广西南宁。

5. 爵床 (本草经) 图版 46: 1—6

Rostellularia procumbens (L.) Nees in Wall., Pl. As. Rar. **3**: 101.1832; DC. Prodr. **11**: 371.1847, p. p. add. spicem. Himal; Benth. Fl. Hongkong: 265.1861; Franch. Pl. David. **1**: 230.1884; C. F. Hsieh & T. C. Huang in Taiwania **19** (1): 26.1974; Y. C. Tang, 中 in Icon. Cormoph. Sin. (中国高等植物图鉴) **4**: 176.f. 5765.1975; 云南种子植物名录 (下册): 1684.1984; H. W. Li in C. Y. Wu, Fl. Xizang (西藏植物志) **4**: 420.f. 182.1—4.1985; 湖北植物大全: 507.1993. — *Justicia procumbens* L. Sp. Pl. **15**.1753; Hance in Journ. Linn. Soc. **13**: 116.1873; Dabx. Fl. Shanghai: 48.1875; C.