

## 3a. 喀西爵床 (原变种)

var. **khasiana**

草本。高 60—100 厘米，茎直立，伸长，4 棱，被多节长硬毛，叶无柄或具短柄，叶片矩圆形，顶端急尖，钝，全缘，基部宽楔形，长约 4 厘米，宽 2.5 厘米，两面被多节长硬毛。穗状花序长 2.5—4 厘米，基部很少间断，明显地被硬毛，苞片狭，线状矩圆形，长 8 毫米，宽 2—3 毫米，被硬毛；花萼近线形，被硬毛。花冠长 8—12 毫米。蒴果长 8 毫米，椭圆形。种子明显具条纹；种皮稍网状。(未见模式标本)。

分布于印度东北 [阿萨姆、卡西山区，模式产地，标本未见)]、缅甸、泰国。海拔 1500 米。我国不产。

## 3b. 宽穗爵床 (云南种子植物名录) (变种)

var. **latispica** (C. B. Clarke) C. Y. Wu, in Index Fl. Yunnan. (云南种子植物名录) 2: 1684. 1984. —— *Rostellularia procumbens* auct. non (L.) Nees in DC. Prodr. 11: 371. 1847. —— *R. mollissima* Nees in DC. Prodr. 11: 373. 1847. —— *Justicia procumbens* var. *latispica* C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 4: 539. 1885; Hand.-Mazz., Sym. Sin. 7: 899. 1936.

植株较粗壮，穗状花序较大，苞片和花冠较长。

产云南 (大理)。生于山谷疏林中，路边，海拔 2100—2700 米。模式标本产地为印度卡西山区。(模式标本未见)。

## 4. 两广线叶爵床 (植物分类学报) 狹叶爵床 (台湾植物志)

**Rostellularia linearifolia** Bremek. subsp. **liankwangensis** H. S. Lo in Acta Phytotax. Sin. 17 (4): 87. 1979. —— *Justicia linearifolia* (Bremek.) H. S. Lo in Guihaia 17 (1): 58. 1997. —— *Justicia linearifolia* ssp. *liankwangensis* H. S. Lo in ibid. 17 (1): 59. 1997.

本亚种的花序轴被硬毛，叶宽 2—4.5 毫米；线叶爵床 *R. linearifolia* Bremek. subsp. *linearifolia* 的花序无毛，叶宽 1.2—1.4 毫米 (老挝和泰国)，故二者区别明显。

产广西 (南宁、柳城)、广东 (廉江)。模式标本采自广西南宁。

## 5. 爵床 (本草经) 图版 46: 1—6

**Rostellularia procumbens** (L.) Nees in Wall., Pl. As. Rar. 3: 101. 1832; DC. Prodr. 11: 371. 1847, p. p. add. spicem. Himal; Benth. Fl. Hongkong: 265. 1861; Franch. Pl. David. 1: 230. 1884; C. F. Hsieh & T. C. Huang in Taiwania 19 (1): 26. 1974; Y. C. Tang, 中 in Icon. Cormoph. Sin. (中国高等植物图鉴) 4: 176. f. 5765. 1975; 云南种子植物名录 (下册): 1684. 1984; H. W. Li in C. Y. Wu, Fl. Xizang (西藏植物志) 4: 420. f. 182. 1—4. 1985; 湖北植物大全: 507. 1993. —— *Justicia procumbens* L. Sp. Pl. 15. 1753; Hance in Journ. Linn. Soc. 13: 116. 1873; Dabx. Fl. Shanghai: 48. 1875; C.



图版 46 1—6. 酢床 *Rostellularia procumbens* (L.) Nees: 1. 植株, 2. 一段茎, 3. 苞片与花萼裂片, 4. 花, 5. 雄蕊示药室与花丝, 6. 蕊果。(林 泉绘)

B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 539. 1885; Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. **26**: 246. 1890; Craib in Kew Bull. : 441. 1911; Dunn et Tutch. in Kew Bull. add. ser. **10**: 200. 1912; Merr. in Sunyatsenia **1**: 37. pl. 13, f. 2. 1930; **1**: 180. 1938; Hand.-Mass. Symb. Sin. **7**: 899. 1936; in Beih. Bot. Centrabl. 56B/**3**: 455. 1937; C. F. Hsieh & T. C. Huang, Fl. Taiwan. ed. **2.4**: 665. photo 343. 1998. ——*Rostellularia trichochila* Miq. in Journ. Bot. Need. **1**: 118. 1861; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 249. 1890. in nota. (Miq. 的模式标本采自中国广东)

### 5a. 爵床 (原变种)

#### var. *procumbens*

草本，茎基部匍匐，通常有短硬毛，高 20—50 厘米。叶椭圆形至椭圆状长圆形，长 1.5—3.5 厘米，宽 1.3—2 厘米，先端锐尖或钝，基部宽楔形或近圆形，两面常被短硬毛；叶柄短，长 3—5 毫米，被短硬毛。穗状花序顶生或生上部叶腋，长 1—3 厘米，宽 6—12 毫米；苞片 1，小苞片 2，均披针形，长 4—5 毫米，有缘毛；花萼裂片 4，线形，约与苞片等长，有膜质边缘和缘毛；花冠粉红色，长 7 毫米，2 唇形，下唇 3 浅裂；雄蕊 2，药室不等高，下方 1 室有距。蒴果长约 5 毫米，上部具 4 粒种子，下部实心似柄状。种子表面有瘤状皱纹。

产秦岭以南，东至江苏、台湾，南至广东，海拔 1500 米以下；西南至云南、西藏（吉隆），海拔 2200—2400 米。生于山坡林间草丛中，为习见野草。亚洲南部至澳大利亚广布。

全草入药，治腰背痛、创伤等。本品在东汉前已载入《神农本草经》，但宋代以后很少入官药而沦为草药。

### 5b. 早田氏爵床（台湾植物志第二版，1998）（变种） 澎湖爵床（台湾植物志，1978）

var. *ciliata* (Yamamoto) S. S. Ying in Mem. Coll. Agr. Natl. Taiwan. Univ. **29** (2): 45. 1989. ——*Justicia hayatai* Yamamoto Suppl. Icon. Pl. Formosa **2**: 35, f. 25. 1926; Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **66**: 372. 1991. ——*Justicia hayatai* Yamamoto var. *ciliata* Yamamoto ibid. **2**: 35. fig. 22. 1926; Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **66**: 322. 1991. ——*Justicia procumbens* var. *hayatai* (Yamamoto) Ohwi in Bull. Nat. Sci Mus. Tokyo **33**: 86. 1953; C. F. Hsieh et C. T. Huang, Fl. Taiwan ed. **2.4**: 667. pl. 305. 1998. ——*Justicia ciliata* (Yamamoto) C. F. Hsieh & T. C. Huang in Taiwania **19** (1): 21. 1974; Fl. Taiwan **4**: 645. pl. 1140. 1978. ——*Justicia hayatai* (Yamamoto) S. S. Ying in Mem. Coll. Agr. Natl. Taiwan. Univ. **29** (2): 45. 1989.

草本，茎铺散或外倾，密被长硬毛。叶几无柄，多汁，卵形或近圆形，长 10—16 毫米，宽 8—10 毫米，顶端钝，基部圆或宽楔形，边全缘，两面密被长硬毛。穗状花序