

长约1—2厘米，具总花梗；苞片阔披针形，长4.2—5毫米，宽1.2—5毫米。顶端钝，边缘稍透明，被长纤毛，背面密被长硬毛；小苞片披针形；花萼裂片线状披针形；花冠堇色，长7—9毫米，宽4—5毫米，外面被微柔毛，冠檐2唇形，上唇直立，三角形，下唇到卵形；花丝稀被纤毛；花柱约长5毫米，近基部被纤毛。蒴果顶端稍被微柔毛。（标本未见）

产台湾 [澎湖岛（模式标本产地，见模式标本照片）、屏东鹅銮鼻]。为澎湖岛和恒春半岛海滨特有。

5c. 密毛（澎湖）爵床（台湾植物志）（变种）

var. **hirsuta** (Yamamoto) S. S. Ying in *ibid.* **29** (2): 44. 1989. — *Justicia procumbens* var. *hirsuta* Yamamoto, *Suppl. Icon. Pl. Formos.* **2**: 32. 1926; C. F. Hsieh et T. C. Huang in *Fl. Taiwan.* ed 2. **4**: 667. 1998. — *Justicia hayatae* Yamamoto var. *decumbens* Yamamoto, *ibid.* **2**: 32. 1926.

茎几铺散，上部上升，基部匍匐，节上生根，密被硬毛，茎上部节上叶对生，卵形或披针形或矩圆状披针形，全缘，长1—1.5厘米，宽0.5—1厘米，顶端钝或略尖，基部圆或极钝，两面密被硬毛。苞片和小苞片及萼片密被硬毛。

产台湾澎湖。（据《台湾植物志》第二版，未见标本）。

5d. 狭叶爵床（台湾植物志）（变种）

var. **linearifolia** (Yamamoto) S. S. Ying in *ibid.* **29** (2): 45. 1989. — *Justicia procumbens* var. *linearifolia* Yamamoto, *l. c.* **2**: 33. 1926; C. F. Hsieh & T. C. Huang in *Taiwania* **19** (1): 21. 1974; *Fl. Taiwan.* **4**: 646. 1978; ed 2. **4**: 667. 1998.

叶线形或稀线状披针形，长1—2.5厘米，宽4—5毫米，顶端极尖或渐尖，基部钝或稍楔形，全缘，两面被极稀疏梳柔毛。

产台湾屏东。

此变种可能即两广线叶爵床 *Rostellularia linearifolia* Bremek. subsp. *liankwangensis* H. S. Lo, 因未见台湾标本，暂志于此。

6. 楠苞爵床（云南种子植物名录）

Rostellularia rotundifolia Nees in Wall., *Pl. As. Rar.* **3**: 100. 1832 et in DC. *Prodr.* **11**: 370. 1847; 云南种子植物名录（下册）: 1684. 1984. — *Rostellaria mollissima* Nees in Wall., *PL. As. Rar.* **3**: 101. 1832, p. p.; in DC. *Prodr.* **11**: 371. 1847, p. p. — *Justicia orbiculata* Wall. Cat. 2489. T. Anders. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **9**: 512. 1867. — *Justicia simplex* D. Don, *Prodr. Fl. Nep.* : 118. 1825; C. B. Clarke in *Fl. Brit. Ind.* **4**: 539. 1885; Bermardi in *Candollea* **18**: 247. 1963. non est *R. simplex* Wight; Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **26**: 247. 1890 quoad Yunnan (Anderson ex Kurz). — *Justicia procumbens* var. *simplex* (D. Don) Yamazaki in *Fl. E. Him.*

302.1966.et in Hara et al., Enum. L. Pl. Nep. 3: 177.1982.

一年生草本，茎匍匐生根，叶圆形，二者同被极硬糙毛，叶片长1—1.5厘米，几规则圆形，顶端圆，具长柄；穗状花序小，花萼5深裂，裂片细长，苞片稍短于萼裂片，自卵形尾尖到宽膜质边缘被硬纤毛。蒴果纯白色，花萼纵向顶端有髯毛-微毛。（仅在 International Documentation Centre AB 为 Candole Prodromi Herbarium 做的微片上见该标本 2441a）

分布于印度（中部、西部广布）、尼泊尔、喜马拉雅（西达克什米尔）、马来西亚，东达日本琉球，几与爵床 *Rostellularia procumbens* 同样广布。

据 T. Anders. (1867: 512.) 文载: Wall. Cat. 2489. 应是 *Justicia orbiculata*, 而非 *Justicia rotundifolia*, 故 *Rostellularia roundifolia* 名不合法。其实 Nees 在 1832 文中已提出本种与 *Rostellularia procumbens* 相近。Hemsl. (1890) 根据自滇西今盈江-瑞丽一带标本定为 *Justicia simplex* D. Don; 云南种子植物名录 2: 1684.1984. 用了椭圆爵床 *Rostellularia rotundifolia* Nees. 作者未见 Hemsl. 所引云南标本，仅在哈佛大学见到王启无 79091 (采自云南景洪) 标签上写着 *affinis R. rotundifolia*. 又在 International Documentation Centre AB 为 Candole Prodromi Herbarium 做的微片上看到 2441a。本属是十分相近的一群草本，多变而不易划分。正如 C. B. Clarke 在 Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 536.1885. 的 *Justicia* sect. 6. 下所述: “Small closely allied weeds, abundant in the tropics, all collected under 3 or 4 ill-defined species by T. Anders. to facilitate thier description it is necessary to arrange them in more species, or reduce them to vars. of one.” 是一群广布于热带、十分相近野草，全可以包括在 T. Ander 所粗放地定义的 3—4 个种，如精究其形态描述可排成许多种，或将其归纳成一种的若干变种。因此，作者也认为他们是一个生态和生活型多样化的一个单种，拟将其归入为爵床 *Rostellularia procumbens* (L.) Nees 种或其变种。