

室 3—4 粒，三棱形，干后黑色。 花、果期 7—11 月。

产于广东、广西、海南和云南等省区；生于低海拔的山谷林缘或草坡旷地上。国外分布于中南半岛、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和印度。

2. 东亚耳草 (新拟)

Hedyotis lineata Roxb. Hort. Beng. 10. 1814, nom. nud. et Fl. Ind. ed. Carey 1: 369. 1820; D. Don, Prodr. Fl. Nepal 134. 1825; Roxb. Fl. Ind. ed. 2, 1: 365. 1832; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 59. 1880; Yamazaki in Fl. E. Himal. 309. 1966; Hara et Gould in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 202. 1979. —*Hedyotis ulmifolia* Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey 1: 370. 1820; Wall. Cat. no. 862. 1829. —*Oldenlandia lineata* (Roxb.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 199. 1891. —*Exallage ulmifolia* (Wall.) Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetens., Afd. Nat., Sect. 2, 48: 142. 1952.

多年生丛生、直立草本或亚灌木，植物全部被浅黄或黄色长毛，高 25—35 厘米；茎钝方柱形，基部木质。叶对生，卵状披针形或椭圆状披针形，通常长 2—3.5 厘米，有时仅长 0.5 厘米，亦有长达 4 厘米，宽 1.2—4.5 毫米，顶端渐尖，基部钝；侧脉每边 3 条，与中脉成锐角斜向上伸，上面常下陷，无柄或具极短的柄；托叶阔三角形，边缘具数条长毛。聚伞花序腋生，有长 3—4 毫米的总花梗，有花数朵；花微小，4 数，具长 2 毫米的花梗；萼管近杯形，萼檐裂片与管近等长或略短；花冠白色，高脚碟形，冠管长为裂片的 3 倍；雄蕊生于冠管基部；花柱内藏。果近球形，细小，成熟时不开裂，有多数细小的种子。 花期 6 月。

产于云南勐海；生于高海拔的杂木林下，少见。国外分布于尼泊尔、锡金、孟加拉国、缅甸。

3. 合叶耳草 (云南种子植物名录)

Hedyotis coronaria (Kurz) Craib Fl. Siam Enum. 2: 38. 1932; Nobuyuki Fukuoka in Southeast Asian Studies 8 (3): 320, fig. 4. 1970. —*Scleromitrium coronarium* Kurz in Journ. Asiat. Soc. Beng. 46 (2): 136. 1877. —*Hedyotis connata* Hook f. Fl. Brit. Ind. 3: 62. 1880; King et Gamble in Journ. Asiat. Soc. Beng. 72 (2): 136. 1903. —*Oldenlandia connata* (Hook. f.) Kuntze Rev. Gen. Pl. 1: 292. 1891; Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 119, fig. 12. 1922. —*Hedyotis coronata* Wall. ex Hook. f. et Jacks. Ind. Kew. 1: 1101. 1895; Ridl. Fl. Malay Penins. 2: 48. 1923. —*Oldenlandia coronata* (Wall. ex Hook. f. et Jacks.) Williams in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 5: 950. 1905.

平卧草本，长 11—13 厘米，具木质根；茎初时近方柱形，被短柔毛。叶对生，膜质或薄纸质，长圆形或长椭圆形，长 5—7 厘米，宽 1.2—2 厘米，顶端短尖，基部钝，无毛，仅下面中脉被短柔毛；侧脉不明显，每边约 5 条，与中脉成锐角斜向上伸；托叶