

表皮光滑。叶对生，纸质或膜质，卵形，卵状披针形或椭圆形，长4—7厘米，罕有长达12厘米，宽2—4厘米，顶端短尖或渐尖，基部楔形，微下延；侧脉纤细，每边4—6条，与中脉成锐角伸出，稍弯拱向上；叶柄长46毫米，上面具槽；托叶宽三角形，长2—4毫米，基部合生，顶端短尖，全缘或具小腺齿。聚伞花序腋生，密集呈团伞状，有花10—18朵，无总花梗，有长2—4毫米的披针形苞片；花具长1—2毫米的花梗；萼管钟形，长0.8—1毫米；萼檐裂片4，三角形，长1—1.2毫米；花冠白色，管长约2毫米，裂片4，披针形，比冠管短，顶端短尖；雄蕊生于冠管喉部，花丝短，花药长圆形，两端截平；花柱长2—2.2毫米，柱头2裂，裂片线形，弯曲。果长圆形，近核果状，长3—4毫米，直径2—3毫米，成熟时不开裂，宿存萼檐裂片长约1毫米；种子每室5—6粒，干后黑色，有窝孔。花期4—6月。

产于海南兴隆；生于低海拔密林下或灌丛中，少见。国外分布于印度、中南半岛、印度尼西亚和菲律宾。

8. 耳草 (植物学名词审查本)

Hedyotis auricularia Linn. Sp. Pl. ed. 1, 101. 1753; DC. Prodr. 4: 420. 1830; Benth. Fl. Hongk. 150. 1861; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 58. 1880; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 128. 1912; Lévl. Cat. Fl. Yunnan 245. 1917; Merr. Enum. Philip. Flow. Pl. 3: 495. 1923 et in Lingnan Sci. Journ. 5: 171. 1927; Nobuyuki Fukuoka in Southeast Asian Studies 8 (3): 311. 1979; 海南植物志 3: 299. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 215, 图 5843. 1975. Hara et Gould in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 202. 1979. ——*Oldenlandia auricularia* (Linn.) F. - Muell. Syst. Cons. Austral. Pl. 74. 1882; Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV. (4): 25. 1891. ——*Exallage auricularia* (Linn.) Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetens. Afd. Nat. Sect. 2, 48: 142. 1952.

8a. 耳草 (原变种)

var. *auricularia*

多年生、近直立或平卧的粗壮草本，高30—100厘米；小枝被短硬毛，罕无毛，幼时近方柱形，老时呈圆柱形，通常节上生根。叶对生，近革质，披针形或椭圆形，长3—8厘米，宽1—2.5厘米，顶端短尖或渐尖，基部楔形或微下延，上面平滑或粗糙，下面常被粉末状短毛；侧脉每边4—6条，与中脉成锐角斜向上伸；叶柄长2—7毫米或更短；托叶膜质，被毛，合生成一短鞘，顶部5—7裂，裂片线形或刚毛状。聚伞花序腋生，密集成头状，无总花梗；苞片披针形，微小；花无梗或具长1毫米的花梗；萼管长约1毫米，通常被毛，萼檐裂片4，披针形，长1—1.2毫米，被毛；花冠白色，管长1—1.5毫米，外面无毛，里面仅喉部被毛，花冠裂片4，长1.5—2毫米，广展；雄蕊生于冠管喉部，花丝极短，花药突出，长圆形，比花丝稍短；花柱长1毫米，被毛，