

点不详。

10. 肉叶耳草 (新拟)

Hedyotis coreana Lév. in Fedde, Rep. Sp. Nov. **11**: 64. 1912; Hatusima in Journ. Jap. Bot. **36**: 297. 1961 et in Mem. Fac. Agri. Kagoshima Univ. **7** (2): 352. 1970 et Fl. Ryukyus 585. 1971; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan **4**: 272. 1978. — *Oldenlandia paniculata* var. *parvifolia* A. Gray ex Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. **29**: 164. 1883. — *O. crassifolia* DC. Prodr. **4**: 427. 1830.

一年生无毛肉质草本，高 10—20 厘米，多分枝，近丛生状；枝纤细，具棱，干后变浅黄色或黄褐色，节间距离 1—2 厘米。叶肉质，对生，无柄，长圆状倒卵形或长圆形，长 1—2 厘米，宽 4—8 毫米，顶端短尖，基部渐狭而下延；侧脉不明显，仅中脉略显著；托叶阔三角形，基部合生，顶端具短尖头。聚伞花序或有时排成短圆锥花序式，有花 3—8 朵，顶生或腋生，有长 7—10 毫米的总花梗；花 4 数，具纤细的花梗；萼管陀螺形，连同萼檐裂片长 3—4 毫米，裂片三角形，细小，长 1 毫米；花冠未开放，外面无毛，里面有透明的疏柔毛；雄蕊生于冠管近基部，花丝短；花柱无毛，柱头浅 2 裂。蒴果扁陀螺形，连同宿存萼檐裂片长 4—5 毫米，宽 2—1.2 毫米，成熟时仅顶部开裂；种子多数，细小，近球形，黑褐色。花期不详。

产于广东南澳、浙江普陀岛和台湾；生于海边的沙滩或泥滩上。国外分布于日本本州和琉球群岛、朝鲜。

11. 阔托叶耳草 (新拟) 图版 5: 1—5

Hedyotis platystipula Merr. in Philip. Journ. Sci. **21**: 510. 1922; 中国高等植物图鉴 **4**: 213, 图 5839. 1975. — *Oldenlandia platystipula* (Merr.) Cnun in Sunyatsenia **1**: 313. 1934.

直立无毛亚灌木状草本，高约 40 厘米；茎略粗，直径约 4 毫米，干后有槽纹，少分枝。叶对生，膜质，长圆状卵形或长圆状披针形，长 8—12 厘米，宽 2.5—4 厘米，顶端短渐尖，基部骤狭，微下延；侧脉明显，每边 4—6 条，与中脉成锐角开出，弯曲向上，小脉明显；叶柄长 1—1.8 厘米；托叶大而薄，肾形，长约 1 厘米，宽 1.5 厘米，边缘撕裂成针状刺，针刺状裂片长 1—1.5 毫米或更长，顶端有黑色小腺体。花序腋生，无总花梗，稠密，团聚，宽约 2 厘米，部分为托叶覆盖；花无梗；萼管陀螺形，长 1.2—1.5 毫米，萼檐裂片 4，狭披针形，长达 6 毫米，有羽状脉，具缘毛；花冠白色，长 8—8.5 毫米，花冠裂片 4，披针形，长约 2 毫米；雄蕊生于冠管喉部，花丝短，花药稍伸出。蒴果长圆形，长 2—3 毫米，宽 1.5—2 毫米，成熟时仅顶部开裂；种子细小，约 10 余粒，干后黑色，粗糙。花期 7—8 月。

产于广东和广西；生于山谷两旁的密林下或溪旁岩石上。模式标本采自广西东兴。

本种以其肾形的托叶和腋生而稠密团聚的花序与本属其他种类区别明显。