

12. 连山耳草 (华南农业大学学报)

Hedyotis lianshanensis Ko in Journ. S. China Agr. Univ. **16** (4): 41. 1995.

直立亚灌木，高 60—80 厘米；茎中空；嫩枝具棱，老枝圆柱形，平滑，节间距离 4—4.5 厘米。叶对生，狭长圆形或狭椭圆形，长 7—10 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，顶端长渐尖，中部以下渐狭，下延至柄；叶柄长 8—10 毫米；托叶长 1—1.5 厘米，基部宽 5—8 毫米，边缘撕裂，裂片纤细呈柔弱的针状刺。花序腋生，无总花梗，部分为托叶覆盖；花具短梗；萼管杯形，长 1—1.2 毫米，外面被疏毛，萼檐裂片 4，披针形，长 1.5 毫米；花冠管长 2 毫米，无毛，有明显的脉纹；花冠裂片披针形，长 2.5 毫米；雄蕊着生于冠管喉部，花丝短，花药长圆形，略伸出花冠管外；花柱长 4 毫米，被疏毛，柱头 2 裂，粗糙。果椭圆形，长约 2 毫米，成熟时不开裂或顶部开裂；种子多粒，微小，有棱。花期 2—5 月。

产于广东连山。生于山谷疏林下，不常见。模式标本采自广东连山。

13. 纤花耳草 (广州植物志)

Hedyotis tenelliflora Bl. Bijdr. 971. 1826; DC. Prodr. **4**: 419. 1830; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 60. 1880; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 375. 1888; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 128. 1912; Merr. Enum. Philip. Flow. Pl. **3**: 500. 1923; Chun in Sunyatsenia **1**: 162. 1933; Nobuyuki Fukuoka in Southeast Asian. Studies **8** (3): 311. 1970; 海南植物志 **3**: 300. 1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 223, 图 5860. 1975; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan **4**: 278. 1978, excl. syn. — *Hedyotis angustifolia* Cham. et Schlecht. in Linnaea **4**: 153. 1829. — *Oldenlandia angustifolia* Benth. Fl. Hongk. 151. 1861. — *O. tenelliflora* (Bl.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **1**: 292. 1891; Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **3**: 106. 1923.

柔弱披散多分枝草本，高 15—40 厘米，全株无毛；枝的上部方柱形，有 4 锐棱，下部圆柱形。叶对生，无柄，薄革质，线形或线状披针形，长 2—5 厘米，宽 2—4 毫米，顶端短尖或渐尖，基部楔形，微下延，边缘干后反卷，上面变黑色，密被圆形、透明的小鳞片，下面光滑，颜色较淡；中脉在上面压入，侧脉不明显；托叶长 3—6 毫米，基部合生，略被毛，顶部撕裂，裂片刚毛状。花无梗，1—3 朵簇生于叶腋内，有针形、长约 1 毫米、边缘有小齿的苞片；萼管倒卵状，长约 1 毫米，萼檐裂片 4，线状披针形，长约 1.8 毫米，具缘毛；花冠白色，漏斗形，长 3—3.5 毫米，冠管长约 2 毫米，裂片长圆形，长 1—1.5 毫米，顶端钝；雄蕊着生于冠管喉部，花丝长约 1.5 毫米，花药伸出，长圆形，两端钝，比花丝略短；花柱长约 4 毫米，柱头 2 裂，裂片极短。蒴果卵形或近球形，长 2—2.5 毫米，直径 1.5—2 毫米，宿存萼檐裂片仅长 1 毫米，成熟时仅顶部开裂；种子每室多数，微小。花期 4—11 月。

产于广东、广西、海南、江西、浙江和云南等省区；生于山谷两旁坡地或田埂上，