

常见。国外分布于印度、越南、马来西亚和菲律宾。

14. 台湾耳草 (新拟)

Hedyotis butensis Masam. in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **28**: 119. 1938; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan **4**: 271. 1978.

一年生草本，高约20厘米，被毛；茎圆柱形；小枝方柱形。叶对生，无柄，纸质，倒披针形、卵状披针形或披针形，长2—6厘米，宽3—10毫米，顶端渐尖，基部短渐尖，上面被微柔毛，下面被毛长而密；托叶阔三角形，长3毫米，被毛，基部宽4毫米，顶端渐尖。花序顶生和腋生，头状；苞片线形，微小，长约1.5毫米；花细小，萼管卵形，被毛，与苞片等长，萼檐裂片4，线形，长约1.5毫米，宽0.2毫米，外面被毛，里面无毛；花冠漏斗形，长1—2.5毫米，外面被毛，花冠裂片长圆状线形，长0.2毫米，宽0.4毫米，顶端钝，里面被毛比外面长而密；花丝长0.2毫米，花药线形，伸出花冠管外；花柱线状，长1—2毫米，柱头被毛，2裂。果球形，直径1.5毫米，成熟时不开裂或仅顶部开裂；种子多数，具棱。花期7—9月。

产于台湾宜兰；极少见。模式标本采自台湾宜兰。

标本未见，形态描述根据有关文献的记载整理而成。

15. 粗叶耳草 (广州植物志) 图版5: 6—11

Hedyotis verticillata (Linn.) Lam. Tabl. Encycl. **1**: 271. 1792; Yamazaki in Hara, Fl. E. Himalaya **310**. 1966; Hara in Hara et al. Enum Flow. Pl. Nepal **2**: 202. 1979. — *Oldenlandia verticillata* Linn. Mant. **1**: 40. 1767. — *Hedyotis hispida* Retz. Obs. Bot. **4**: 23. 1786; Roxb. Fl. Ind. ed. Carey **1**: 368. 1820; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 60. 1880; 海南植物志 **3**: 300. 1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 214, 图5841. 1975; 浙江植物志 **6**: 120, 图6—151. 1991. — *O. hispida* Poir. in Lam. Encycl. Suppl. **4**: 536. 1816, non DC. Prodr. **4**: 428. 1830; Benth. Fl. Hongk. **150**. 1861.

一年生披散草本，高25—30厘米；枝常平卧，上部方柱形，下部近圆柱形，密被或疏被短硬毛。叶对生，具短柄或无柄，纸质或薄革质，椭圆形或披针形，长2.5—5厘米，宽6—20毫米，顶端短尖或渐尖，基部楔形或钝，两面均被短硬毛，触之刺手，干后边缘反卷；无侧脉，仅具中脉1条，中脉在上面压入；托叶略被毛，基部与叶柄合生成鞘，顶部分裂成数条刺毛，刺毛长3—4毫米。团伞花序腋生，无总花梗，有披针形、长3—4毫米的苞片；花无花梗；萼管倒圆锥形，长约1毫米，被硬毛，萼檐裂片4，披针形，长1—1.5毫米；花冠白色，近漏斗形，除花冠裂片顶端有髯毛外无毛，长3.8—4毫米，冠管长约2毫米，顶部4裂，裂片披针形，长1.8—2毫米；雄蕊生于冠管喉部，花丝长约2毫米，花药伸出，长圆形，两端钝，长仅1毫米；花柱长4—4.5毫米，顶端膨大，头状，粗糙。蒴果卵形，长1.5—2.5毫米，直径1.5—2毫米，被硬