

毛，成熟时仅顶部开裂，冠以长1.5—2.5毫米的宿存萼檐裂片；种子每室多数，具棱，干时浅褐色。花期3—11月。

产于海南、广西、广东、云南、贵州、浙江和香港等省区；生于低海拔至中海拔的丘陵地带的草丛或路旁和疏林下。国外分布于印度、尼泊尔、越南、马来西亚和印度尼西亚。

全草清热解毒、消肿止痛。

16. 松叶耳草 (广州植物志) 图版 4: 9—14

Hedyotis pinifolia Wall. (Cat. 25, no. 850. 1829, nom. nud.) ex G. Don, Gen. Syst. 3: 526. 1834; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 60. 1880; Maxim. Mém. Biol. 11: 784. 1883; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 375. 1888; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 128. 1912; Ridl. Fl. Malay Penins. 2: 52. 1923; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 172. 1927; 海南植物志 3: 301. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 223, 图 5859. 1975. —*Oldenlandia pinifolia* (Wall. ex G. Don) K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (4): 25. 1891; Kuntze, Rev. Gen. Pl. 1: 292. 1891; Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 108. 1923; Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. 56 (B): 463. 1937.


柔弱多分枝披散草本，高10—25厘米；枝纤细，锐四棱柱形，干时黑褐色。叶丛生，很少对生，无柄，坚硬而挺直，线形，长12—25毫米，宽1—2毫米，顶端短尖，边缘干时背卷，两面粗糙，很少被毛；中脉在上面压入，侧脉不明显；托叶下部合生成短鞘，顶部分裂成长短不等的数条刺毛。团伞花序有花3—10朵，顶生和腋生，无总花梗；苞片披针形，长3—4毫米，被疏毛和具缘毛；花4数，具长0.8—1毫米的花梗；萼管倒圆锥形，长1—1.5毫米，被疏硬毛，萼檐下部管状，长达2毫米，裂片钻形，长约1毫米，长渐尖，具缘毛；花冠管状，长8—8.5毫米，管长4—4.2毫米，裂片长圆形；雄蕊着生于冠管喉部，花丝长约2毫米，花药伸出，长圆形，两端钝，比花丝短2/3；花柱长9毫米，柱头2裂，裂片线形，长约1毫米，广展，内弯。蒴果近卵形，长2.5—3毫米，直径1.5—2毫米，中部以上被疏硬毛，成熟时仅顶部开裂，宿存萼檐裂片长1—1.2毫米；种子每室数粒，具棱，干后浅褐色。花期5—8月。

产于广东、海南、广西、云南等省区；生于丘陵旷地或滨海砂荒地上，常见。国外分布于印度、尼泊尔、越南和马来西亚。

据《广西中药志》记载全草治小儿疳积、潮热等症，外用跌打刀伤。

组 2. 二裂果组 Sect. *Diplophragma* Wight et Arn. Prodr. 406. 1834.

蒴果室间开裂为2果片，每果片含1—4粒（罕有多于此数）种子，果片腹部直裂，顶部不隆起。直立或平卧灌木和草本；托叶各式。



图版 4 1—8. 脉耳草 *Hedyotis costata* (Roxb.) Kurz: 1. 植株; 2. 托叶放大; 3. 花 (4 数); 4. 花冠展开; 5. 花柱和柱头; 6. 花 (5 数); 7. 花冠展开; 8. 果实。9—14. 松叶耳草 *Hedyotis pinifolia* Wall. ex G. Don: 9. 植株; 10. 托叶和茎的一部分; 11. 花; 12. 花冠展开; 13. 花柱和柱头; 14. 果实。(余峰绘)